

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وَأَزَلَّةُ الثَّيْبَةِ وَالطَّعْنِ

رياضيات مهني

الرزمة التعليمية

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وَأَزَلَّةُ الثَّيْبَةِ وَالطَّعْنِ



مركز المناهج

moche.gov.ps | moche.pna.ps | moche.ps

<https://www.facebook.com/Palestinian.MOEHE/>

هاتف +٩٧٠-٢-٢٩٨٣٢٨٠ | فاكس +٩٧٠-٢-٢٩٨٣٢٥٠

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب ٧١٩ - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

المحتويات


٢	الدرس الأول: تمثيل الاقترانات باستخدام الانسحاب
٤	الدرس الثاني: تمثيل الاقترانات باستخدام الانعكاس
٦	الدرس الثالث: اشارة الاقتران
١١	الدرس الرابع: الاقترانات متعددة القاعدة
١٢	الدرس الخامس: اقتران القيمة المطلقة
١٤	ورقة عمل
١٥	اختبار ذاتي
١٨	الدرس الأول: الأسس واللوغاريتمات
٢٣	الدرس الثاني: الاقتران الأسّي
٢٧	الدرس الثالث: الاقتران اللوغاريتمي
٣٠	الدرس الرابع: الارتباط الخطي
٣٢	الدرس الخامس: معامل ارتباط بيرسون
٣٥	الدرس السادس: الانحدار الخطي البسيط
٣٨	الدرس السابع: مبدأ العدّ
٤٠	الدرس الثامن: التباديل
٤٢	الدرس التاسع: التوافيق
٤٣	اختبار ذاتي
٤٥	الدرس الأول: الزاوية في الوضع القياسي
٤٩	الدرس الثاني: قياس الزوايا
٥٢	الدرس الثالث: الاقترانات المثلثية
٥٩	الدرس الرابع: تمثيل الاقترانات المثلثية بيانياً
٦٤	ورقة عمل
٦٦	اختبار ذاتي
٦٧	الدرس الأول: إنشاءات هندسيّة (١)
٧١	الدرس الثاني: إنشاءات هندسيّة (٢)
٧٥	الدرس الثالث: المثلث
٧٩	الدرس الرابع: تكافؤ الأشكال الهندسية
٨٤	الدرس الخامس: الأسهم
٨٦	ورقة عمل
٨٧	اختبار ذاتي

يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الرزمة التعليمية والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على
توظيف الاقترانات بأنواعها المختلفة في الحياة العمليّة من خلال الآتي:

- استخدام التحويلات الهندسيّة في رسم منحني اقترانٍ ما، في المستوى الديكارتي.
- تحديد إشارة بعض الاقترانات.
- تمثيل اقترانٍ متعدد القاعدة بيانياً.
- التعرف إلى مفهوم اللوغاريتم وعلاقته بالأسس.
- استنتاج قوانين اللوغاريتمات.
- حلّ معادلات لوغاريتمية.
- تمثيل الاقترانات الأسّيّة بيانياً.
- استنتاج خصائص الاقتران الأسّي.
- تمثيل الاقتران اللوغاريتمي بيانياً.
- استنتاج خصائص الاقتران اللوغاريتمي.
- توظيف التحويلات الهندسيّة المختلفة في رسم الاقترانات اللوغاريتمية والأسّيّة.
- استنتاج العلاقة بين الاقترانين الأسّي واللوغاريتمي.
- رسم شكل الانتشار الذي يمثّل العلاقة بين متغيّرين.
- إيجاد معامل ارتباط بيرسون.
- كتابة معادلة الانحدار.
- استخدام مبدأ العد في سياقات حياتيّة.
- حساب التباديل الرائية لمجموعة تحتوي ن من العناصر.
- حساب التوافيق الرائية لمجموعة تحتوي ن من العناصر.
- استخدام نظرية ذات الحدين في إيجاد مفكوك مقدار جبري.
- التعرف إلى مفهوم الزوايا الموجّهة.
- التعرف إلى مفهوم قياسي الزاوية: الستيني والدائري.
- التحويل من القياس الستيني إلى القياس الدائري وبالعكس.
- التعرف إلى الوضع القياسي للزاوية، والزوايا المتكافئة.
- تمثيل منحنيات الاقترانات الدورية (المثلثية) بيانياً.
- القيام بالإنشاءات الهندسيّة الآتية:
 - تصنيف قطعة مستقيمة، وتصنيف زاوية.
 - رسم مستقيم مواز لمستقيم آخر.
 - تمثيل العمليات الحسابية بالإنشاءات الهندسية.
 - إقامة عمودٍ على مستقيمٍ من نقطة واقعةٍ عليه.
 - إنزال عمودٍ على مستقيمٍ من نقطة خارجةٍ عنه.
 - التعرف على نظريات تكافؤ الأشكال الهندسية.
 - التعرف إلى مفهوم الأسهم.
 - التعرف إلى مفهوم السندات.

تمثيل الاقترانات باستخدام الإنسحاب (Translation)

١



في الشكل المجاور ، أنظرُ إلى
منحنى الاقتران
ق(س) = س^٢ ، س ∈ ح ،
ومنحنى الاقتران
ل(س) = س^٢ + ٣




ألاحظ أن: منحنى ل(س) هو انسحاب لمنحنى ق(س) بمقدار للأعلى.

. أمثلُ بيانياً منحنى الاقتران: ه(س) = س^٢ - ٤ .

أتعلم: منحنى الاقتران ل(س) = ق(س) + ج هو انسحاب لمنحنى الاقتران ق(س) بمقدار ج وحدة إلى الأعلى إذا كانت ج < ٠ ، وانسحاب بمقدار |ج| وحدة إلى الأسفل إذا كانت ج > ٠ .

أنظرُ إلى منحنى الاقتران: ق(س) = √س ، س ≤ ٠ في الشكل الآتي:




منحنى الاقتران ل هو انسحاب لمنحنى الاقتران ق
بمقدار

. قاعدة الاقتران ل هي:

أمثلُ بيانياً منحنيات الاقترانات الآتية:

- ك(س) = √س - ٢
- ه(س) = √س + ١



اعتماداً على منحنى
ق(س) = س³ ، س ∈ ح
ومنحنى الاقتران:
ل(س) = (س - ٤)^٣




منحنى الاقتران ل هو انسحاب لـ ... بمقدار ... وحدات.


أمثلُ منحنيات الاقترانات: ه(س) = (س + ٥)^٣ ، ك(س) = (س + ٣)^٣ - ٢ ، في المستوى الديكارتي.

أتعلمُ: منحنى الاقتران ق(س + ج) هو انسحاب إلى اليسار لمنحنى الاقتران ق(س) بمقدار ج وحدة، إذا كانت ج < ٠ ، وانسحاب إلى اليمين بمقدار |ج| وحدة، إذا كانت ج > ٠ .

تمارين ومسائل:



(١) أرسمُ الشكلَ الرباعيَّ المرسومَ في المستوى الديكارتي بعد انسحابه وحدتين إلى اليسار، ومن ثم ٣ وحداتٍ إلى الأسفل.



(٢) بالاعتماد على منحنى ص = ق(س) ،
س ≤ ٠ الممثل في المستوى الديكارتي،
أمثل منحنى كل من الاقترانات الآتية في
المستوى نفسه

أ) ه(س) = ق(س) - ٥

ب) ل(س) = ق(س) + ٤

ج) د(س) = ق(س) + ٣

تمثيل الاقترانات باستخدام الإنعكاس (Reflection)

٢

انعكاس النقطة P (س،ص) في محور السينات هي النقطة P' (س،-ص).

أكمل الجدول الآتي:


٢-	١-	٠	١	٢	س
٧-		١			ق(س) = $١ + ٣س$
				٩-	ق(س) - = $(١ + ٣س)$



- أعيّن النّقاط من الجدول في المستوى الديكارتي، وأمّثل منحنى الاقتران ق(س).
- أعيّن النّقاط من الجدول في المستوى نفسه، وأمّثل منحنى الاقتران -ق(س).

ألاحظ أنّ:

أتعلّم: منحنى الاقتران -ق(س) هو انعكاس لمنحنى الاقتران ق(س) في محور السينات.



يُمثّل الشكل الآتي منحنى الاقتران:


$$ق(س) = \sqrt{س} ، س \leq \text{صفر} .$$



أمّثل منحنى الاقتران ل(س) = $\sqrt{-س}$ على المستوى.

انعكاس النقطة P (س،ص) في محور الصادات هي النقطة P' (-س،ص).

أتذكّر



يُمثِّل الشكلُ المجاورُ منحنى الاقتران

$$ق(س) = 3س + 1$$

أُكْمَلُ: بالاعتماد على القاعدة، يكون

$$ق(-س) = 3(-س) + 1 = \dots\dots\dots$$



س	٣	٠	-١
ق(-س)		١	

بالاعتماد على الجدول، أمثِّل منحنى الاقتران ق(-س) في المستوى الديكارتي.

أَتَعَلَّمُ: منحنى الاقتران ق(-س) هو انعكاس لمنحنى الاقتران ق(س) في محور الصادات.


تمارين ومسائل:

(١) أكتب الزوج المرتب الذي يمثِّل التحويلات الهندسيَّة على النقطة (٣، -٤)، في الحالات الآتية:

- أ) انعكاس في محور الصادات.
- ب) انعكاس في محور السينات.

(٢) أصِفُ بالكلمات التحويلات الهندسيَّة الآتية على منحنى ق(س):

- أ) ق(-س)
- ب) ق(س) + ١
- ج) ق(س) - ٢ + ٣



مهمة تقويمية:

اعتماداً على منحنى ق(س) المرسوم،
أرسم منحنيات الاقترانات الآتية:

- أ) ق(-س) - ١
- ب) ق(س) + ١
- ج) ق(-س)

أولاً: إشارة الاقتران الثابت

أعطي أمثلةً على اقترانات ثابتة.

• ق (س) = ١٢ ، وإشارته موجبة.


• ل (س) = -٢٣ ، وإشارته

• ك (س) = ، وإشارته موجبة. • هـ (س) = ، وإشارته

نشاط

نشاط

أتعلّم: إشارة الاقتران الثابت ق (س) = ج ، ج \exists ح ، هي إشارة ج نفسها.



ثانياً: إشارة الاقتران الخطي

يبين الشكل المجاور

منحنى اقتران خطي ،

قاعدته ق (س) = $\frac{1}{3}س - 2$


نشاط

نشاط

- نقطة تقاطع منحنى الاقتران مع محور السينات هي: (.....,.....).
- صفر الاقتران هو:
- الفترة التي وقع فيها المنحنى فوق محور السينات هي: ، وتكونُ إشارته
- الفترة التي وقع فيها المنحنى تحت محور السينات هي: ، وتكونُ إشارته
- أعيّن إشارة الاقتران على خط الأعداد:




أتعلم: إشارة الاقتران الخطي ق (س) = $أس + ب$ ، س \exists ح ، $أ \neq 0$ صفر هي نفس إشارة معامل س ، لكلّ س أكبر من صفر الاقتران ، وعكس إشارة معامل س ، لكلّ س أصغر من صفر الاقتران .




يُمكنُ توضيحُ ذلك على خط الأعداد:

- مثال (١): أعيّن إشارة الاقتران ق(س) = $٤ - ٢س$
- الحل: صفر الاقتران = ٢، إذن: يقطع منحنى الاقتران محور السينات في النقطة (٢، ٠).
- إشارة الاقتران (+) موجبة "عكس إشارة معامل س"، لكلّ $س > ٢$.
 - إشارة الاقتران (-) سالبة "إشارة معامل س نفسها"، لكلّ $س < ٢$.
 - أعيّن الإشارة على خط الأعداد الآتي:




- يُمكن كتابة الحلّ بالصورة: ق(س) < صفر (موجبا)، في الفترة]٢، ٥٥[
- ق(س) > صفر (سالبا)، في الفترة]٥٥، ٢[
- ق(س) = صفر، عندما $س = ٢$.



ثالثا: إشارة الاقتران التربيعي


أتأمل منحنى الاقتران المرسوم ق(س) = $س^٢ - ٤$ ،
 وإشارة الاقتران الموضحة على خط الأعداد:



- يقطع المنحنى محور السينات في النقطتين: (.....،)، (.....،)
- يقع منحنى الاقتران تحت محور السينات في الفترة
- يقع منحنى الاقتران فوق محور السينات في الفترة
- إشارة الاقتران موجبة في الفترة
- إشارة الاقتران سالبة في الفترة
- أصفار الاقتران هي:

أتعلم: إشارة الاقتران التربيعي تكون عكس إشارة معامل s^2 بين صفري الاقتران، وما عدا ذلك فهي إشارة معامل s^2 .

ويمكن توضيح ذلك بالشكل؛ حيث ل، م هما صفرا الاقتران ق، ل < م :



أعيّن إشارة الاقتران ق الذي قاعدته ق(س) = $s^2 - 1$

- أصفار الاقتران هي:
- إشارة معامل s^2 هي:



- إشارة الاقتران موجبة (عكس إشارة معامل s^2) في الفترة
- إشارة الاقتران سالبة (نفس إشارة معامل s^2) في الفترة
- أرسم خطّ الأعداد، وأعيّن عليه إشارة الاقتران:



- يقع منحنى الاقتران فوق محور السينات في الفترة
- يقع منحنى الاقتران تحت محور السينات في الفترة

أتعلم:

- * إشارة الاقتران التربيعي: هي إشارة معامل s^2 ، إلا عند صفر الاقتران، إذا كان له صفر واحد فقط.
- * إشارة الاقتران التربيعي هي إشارة معامل s^2 ، إذا لم يقطع منحناه محور السينات.

رابعاً: إشارة الاقتران النسبي

يُسمّى الاقتران ق اقتراناً نسبياً إذا كانت قاعدته على الصورة الآتية:

$$ق(س) = \frac{ل(س)}{م(س)} \text{ حيث ل، م كثيرا حدود ، م(س) } \neq \text{ صفر.}$$

أُعيّن إشارة الاقتران: ق(س) = $\frac{س + ٣}{س^٢ - ٢س - ٣}$ ، س $\neq ٣$ ، ١-



أُعيّن إشارة البسط (س + ٣)، كاقترانٍ خطّي على خطّ الأعداد:

أُعيّن إشارة المقام (س^٢ - ٢س - ٣)، كاقترانٍ تربيعي على خطّ الأعداد



أُعيّن إشارة الاقتران النسبي ق على خطّ الأعداد:

أُعيّن إشارة الاقتران ق الذي قاعدته: ق(س) = $\frac{٥}{س + ١}$ ، س $\neq ١-$



• إشارة البسط هي

- أُعيّن إشارة البسط على خطّ الأعداد:
- أُعيّن إشارة المقام (س + ١) على خطّ الأعداد:
- أُعيّن إشارة الاقتران النسبي ق على خطّ الأعداد:

تمارين ومسائل:


(١) أعيّن إشارة كلٍّ من الاقتران الآتية:

أ (هـ (س) = $\epsilon - س$

ب (ع (س) = $\epsilon - \epsilon - س - س^2$

ج (م (س) = $\frac{1-}{س}$ ، س \neq صفر

(٢) أعيّن إشارة الاقتران ق على الفترة $[-٣ ، ٤]$:



مهمة تقويمية:

ابحث في إشارة كل من الاقتران الآتية:

أ (هـ (س) = $\epsilon - س - \epsilon$

ب (ق (س) = $س^2 - س + ٦$

ج (م (س) = $\frac{ق (س)}{هـ (س)}$ ، هـ (س) \neq صفر

الاقترانات متعددة القاعدة (Piecewise Functions)

٤

تعريف

الاقتران متعدد القاعدة: هو اقتران له أكثر من قاعدة معرفة على مجاله.

من الأمثلة على الاقترانات متعددة القاعدة:

$$(1) \text{ ق}(س) = \left. \begin{array}{l} س + 1 , س \leq 1 \\ س^2 , س > 1 \end{array} \right\}$$

$$(2) \text{ ق}(س) = \left. \begin{array}{l} س^2 , س \geq -5 \\ 4 , -5 > س > 5 \\ س - 3 , س \leq 5 \end{array} \right\}$$

(٣) أعط مثلاً لاقتران متعدد القاعدة



تمارين ومسائل:

(١) أرسم منحنى كلٍّ من الاقترانات الآتية:

$$\text{ق}(س) = \left. \begin{array}{l} 3 , س > 4 \\ س , -4 \leq س \leq 2 \\ -س + 6 , س < 2 \end{array} \right\}$$

$$\text{ق}(س) = \left. \begin{array}{l} س^2 + 1 , س > \text{صفر} \\ س^2 , س \leq \text{صفر} \end{array} \right\}$$

اقتران القيمة المطلقة* (Absolute Value)

٥

أجد ناتج ما يأتي:

$$\begin{aligned} \dots\dots\dots &= |3-| & \dots\dots\dots &= |4| & \dots\dots\dots &= |3- \\ \dots\dots\dots &= |12-0| & \dots\dots\dots &= |4-1-| & \dots\dots\dots &= |3-4| \end{aligned}$$




يُسمّى الاقتران المكتوب على صورة ق(س) = |س| **اقتران القيمة المطلقة**، ويمكن كتابة الاقتران ق(س)، دون استخدام رمز القيمة المطلقة، كما يأتي:

$$ق(س) = |س| = \begin{cases} س & ، \quad س \leq \text{صفر} \\ س - & ، \quad س > \text{صفر} \end{cases}$$

تعريف

عند تمثيل الاقتران ق(س) = |س| في المستوى الديكارتي يظهر كما في الشكل: أجب عمّا يلي:



(أ) مجال الاقتران هو ح.

(ب) مدى الاقتران هو

(ج) أرسم محور التماثل.

(د) أحدّد صفر الاقتران

(هـ) هل الاقتران واحد لواحد؟ لماذا؟



* يعتبر اقتران القيمة المطلقة من الاقترانات متعددة القاعدة.

أعيدُ تعريف الاقتران ق(س) = |س - ٣| ، دون استخدام رمز القيمة المطلقة:



$$\left. \begin{array}{l} \text{س} - ٣ \leq \text{صفر} \\ \text{س} - ٣ > \text{صفر} \end{array} \right\} = \text{ق(س)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \leq ٣ \\ \text{س} > ٣ \end{array} \right\} = \text{ق(س)}$$

مجال ق(س):

مدى ق(س):


منحنى ق(س) = |س - ٣| انسحاب لمنحنى |س| وحدة إلى

أعيد تعريف ق(س) = |س^٢ - ٤|



$$\left. \begin{array}{l} \text{س}^٢ - ٤ \leq ٠ \\ \text{س}^٢ - ٤ > ٠ \end{array} \right\} = |س^٢ - ٤|$$

لحل المتباينات نبحث في إشارة س^٢ - ٤



$$\left. \begin{array}{l} \text{س} > ٢- \\ ٢- \geq \text{س} \geq ٢- \\ \text{س} < \dots \end{array} \right\} = |س^٢ - ٤|$$

تمارين ومسائل:

(١) إذا كان: ق(س) = $|س - ٣|$ ، ه(س) = $|س - ٢|$ ، أجد:

$$\text{ق(٢) ، ق(-٥) ، ه(-١) ، ه(٠) ، ق\left(\frac{٢}{٣}\right)}$$

(٢) أعيدُ تعريفُ الاقترانات الآتية، دون استخدام رمز القيمة المطلقة:

$$\text{أ) ق(س) = } |٢ + س٣| \quad \text{ب) ق(س) = } |س - ٤|$$

$$\text{ج) ق(س) = } |-س٣ + ٣| \quad \text{د) ق(س) = } \left|١ - \frac{١}{٢}س\right|$$

(٢) أجد مجال ومدى وأصفار الاقترانات السابقة.

(٣) أعيدُ تعريفُ كل من الاقترانات الآتية:

$$\text{أ) ق(س) = } |س٥ - س٢| \quad \text{ب) ق(س) = } |س٥ - ٦ + س|$$

مهمة تعليمية:

أعيد تعريف الاقترانات الآتية دون استخدام رمز القيمة المطلقة:

$$\text{أ) ق(س) = } |س + ٢| + س \quad \text{ب) ق(س) = } |س|$$

$$\text{ج) ق(س) = } |س - ٣| + ٢$$

ورقة عمل:

السؤال الأول:

(١) ما قاعدة الاقتران الناتجة من انسحاب منحنى ق(س) وحدتين إلى اليسار، ثم وحدتين إلى الأعلى؟

أ) ق(س) + ٤ (ب) ق(س) - ٤ (ج) ق(س + ٢) + ٢ (د) ق(س - ٢) + ٢

(٢) ما صورة منحنى ق(س) المعكوس في محور السينات، من منحنيات الاقترانات الآتية؟

أ) ق(-س) (ب) -ق(-س) (ج) -ق(س) (د) ق(س - ١)





(٣) أيُّ من الاقترانات الآتية اقترانٌ نسبيّ؟

أ) $\frac{3}{\sqrt{s}}$ (ب) $\frac{s - \frac{1}{s}}{s}$ (ج) $\frac{1}{s}$ (د) $\frac{s - 1}{s} \sqrt{\quad}$

(٤) محور تماثل ق(س) = $|s - 10| - 2s$ ، هو الخط المستقيم:

أ) $s = 5$ (ب) $s = -5$ (ج) $s = 5$ (د) $s = -5$

(٥) أيُّ من الآتية خطأ إشارة الاقتران ق(س) = (س - ١) (١ - س)؟



(٦) ليكن: ق(س) = $|3s + 4|$ فما قيمة ق(-٣)؟

أ) -٥ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ١٣

السؤال الثاني:

أبحثُ في إشارة كلِّ من الاقترانات الآتية:

$$\text{أ) ل (س) = س}^2 + 3س + 2$$

$$\text{ب) م (س) = 8 - 2س}$$

$$\text{ج) ق (س) = } \frac{\text{ل (س)}}{\text{م (س)}} \text{، م (س) } \neq \text{ صفر.}$$

السؤال الثالث:

أكتب الاقترانات الآتية، باعتبارها اقتراناتٍ متعدّدة القاعدة:

$$\text{ب) ل (س) = |س}^2 - 25|$$

$$\text{أ) ق (س) = |س}^2 + 6|$$

$$\text{د) ع (س) = } \left[5 - \frac{1}{3}س \right]$$

$$\text{ج) ك (س) = } \left[3 - \frac{1}{4}س \right]$$

اختبار ذاتي

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي :

(١) إشارة الاقتران ق(س) = π هي:

- (أ) موجبة عندما $s < 0$.
 (ب) سالبة عندما $s \ni \text{ح}$
 (ج) موجبة عندما $s \ni \text{ح}$
 (د) سالبة عندما $s > \text{ح}$

(٢) محور تماثل الاقتران ق(س) = $10 - 2|s|$ هو:

- (أ) $s = 0$ (ب) $s = -5$ (ج) $s = 5$ (د) $s = 0$

(٣) قيم س التي تجعل ق(س) = $8 - 4s$ فوق محور السينات هي:

- (أ) $s \leq 2$ (ب) $s \ni [2, \infty)$ (ج) $s \ni]2, \infty$ (د) $s = 2$

(٤) قاعدة الاقتران الممثل بيانياً كما في الشكل المجاور:

- (أ) ق(س) = $|s^2 - 2s - 1|$
 (ب) ق(س) = $|s - 2| - 1$
 (ج) ق(س) = $|s - 2| + 1$
 (د) ق(س) = $|s - 2| - 1$

(٥) انعكاس النقطة (٢-، ٥) في محور الصادات هي:


- (أ) (٢-، ٥) (ب) (٢، ٥-) (ج) (٢، ٥) (د) (٢-، ٥)

(٦) إشارة الاقتران ق(س) = π :

- (أ) موجبة دائماً. (ب) سالبة دائماً. (ج) لا يمكن التحديد. (د) موجبة فقط عند π

(٧) منحنى الاقتران ق(س) = $\sqrt{s+1}$ هو انسحاب لمنحنى الاقتران هـ (س) = \sqrt{s} بمقدار وحدة واحدة إلى:

- (أ) اليمين. (ب) اليسار. (ج) الأعلى. (د) الأسفل.



السؤال الثاني:

- بالاعتماد على الشكل المجاور أجب عما يأتي :

(أ) ما أصفار الاقتران؟

(ب) ما مدى الاقتران؟

(ج) ما قاعدة الاقتران؟

الأسس واللوغاريتمات


٦

أكمل الجدول الآتي:

المقدار	2^2	2^{-3}	$\frac{1}{3}^8$	4^0	$5^9 \div 5^7$	$\frac{1}{2}^2$	$4^2 \times 4^{-1}$
قيمة المقدار	٨	$\frac{1}{9}$					



تعريف: إذا كان $v = m^p$ ، حيث v ، m ، p حيث $v > 0$ ، $m > 0$ ، $m \neq 1$ ، نسمي p لوغاريتم العدد v للأس m ، ويُعبّر عنه رياضياً: $\log_m v = p$ (ص) = p (الصورة اللوغاريتمية)، ويُقرأ لوغاريتم v للأس m يساوي p . المثال الآتي يوضح العلاقة بين الصورة الأسية، والصورة اللوغاريتمية:



أكمل الجدول الآتي بما يناسبه:



الصورة الأسية	$8^2 = 2^3$	$\frac{1}{81} = 3^{-4}$	$1 = 9^0$
الصورة اللوغاريتمية	_____	$\log_{10}(10000) = 4$	$\log_{10} 1 = 0$

أحول الآتي من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية:

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| أ) $13 = 3^2$ | ب) $2 = 12$ | ج) $1 = 3^2$ |
| د) $1 = 5^0$ | هـ) $81 = 3^4$ | و) $32 = 2^5$ |



(أ) لوم (٣) = ١ (ب) لوم (٢) = _____ (ج) لوم (١) = صفر
 (د) لوم (١) = _____ (هـ) لوم ٨١ = ٤ (د) لوم ٣٢ = _____

ماذا تلاحظ؟

أتعلم: لوم (١) = ١، لوم (١) = صفر، لوم ٢ = ٣

أجد قيمة اللوغاريتمات الآتية:

(١) لوم (٢) = ٠.٦

(٢) لوم (٧) = _____

(٣) لوم (١/٩) = _____

أكمل الجدول الآتي ثم أجب عما يليه:

٣٢	١٦	٨		٢	س
٥	٤	٣	٢	١	لوم (س)
	٢			١/٢	لوم (س)

(١) لوم (٢ × ٤) = لوم (٨) = ٣ ، لوم (٢) + لوم (٤) = لوم (٨) = ٣

(٢) لوم (٨ × ٢) = _____ ، لوم (٢) + لوم (٨) = _____

(٣) لوم (٤ × ٢) = _____ ، لوم (٢) + لوم (٤) = _____

(٤) لوم (٨ × ٢) = _____ ، لوم (٢) + لوم (٨) = _____

ماذا تلاحظ؟

أتعلم: إذا كان س، ص عددين حقيقيين موجبين، وكان ٢ عدداً حقيقياً موجباً غير الواحد، فإن: لوم (س × ص) = لوم (س) + لوم (ص).

أكمل الجدول الآتي ثم أجب عما يليه:



	٨١	٢٧		٣	س
٥			٢	١	لوم (س)

$$(1) \text{ لوم } \left(\frac{٨١}{٢٧}\right) = \text{لوم } (٣) = ١ = ٣ - ٤ = \text{لوم } (٢٧) - \text{لوم } (٨١) ,$$

$$(2) \text{ لوم } \left(\frac{٢٤٣}{٩}\right) = \text{لوم } (٢٤٣) - \text{لوم } (٩) = \text{لوم } (٩) - \text{لوم } (٢٤٣)$$

ماذا تلاحظ؟

أتعلم: إذا كان س، ص عددين حقيقيين موجبين، وكان l عدداً حقيقياً موجباً غير الواحد، فإن: لوم $\left(\frac{س}{ص}\right) = \text{لوم } (س) - \text{لوم } (ص)$

أتعلم: إذا كان ص عدداً حقيقياً موجباً، فإن: لوم $(ص)^m = m \text{ لوم } (ص)$ ، بحيث $m \in \mathbb{C}^*$.

اكتب كل مما يأتي بصورة لوغاريتم واحد:



$$(1) \text{ لوم } (٨) - \text{لوم } (ص) = \text{لوم } \left(\frac{٨}{ص}\right)$$

$$(2) \text{ لوم } (٤) + \text{لوم } (س) - \text{لوم } (٣) = \text{لوم } (٤س) - \text{لوم } (٣)$$

$$=$$

إذا كان لوم $(٧) = ٢,٨١$ ، أجد قيمة كل مما يأتي:



$$(1) \text{ لوم } (٢٨) \quad (2) \text{ لوم } (٧)^٣ \quad (3) \text{ لوم } (٥,٣)^٢$$

$$(1) \text{ لوٲ (٢٨) = لوٲ (٧×٤) = لوٲ (٤) + لوٲ (٧) = ٢,٨١ + ٢ = ٤,٨١}$$

$$(٢) \text{ لوٲ (٧) = لوٲ (٧) × ٣ = ٨,٤٣ = } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(٣) \text{ لوٲ (٣,٥) = لوٲ () = } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ((\text{) لوٲ - () لوٲ) × \underline{\hspace{1cm}} =$$

مثال: أحل المعادلة: لوٲ (س + ٢) - لوٲ (س - ١) = ٢

$$\text{الحل: لوٲ (س + ٢) - لوٲ (س - ١) = لوٲ (س+٢) = } \frac{٢+س}{١-س} = ٢$$

$$٢ = \frac{٢+س}{١-س}$$

$$٢(١-س) = ٢+س$$

$$٢ - ٢س = ٢+س \quad \text{، ومنها: س = ٢}$$

أحلّ المعادلة: لوٲ (س) + لوٲ (٣) = ٢

$$٢ = (\text{) لوٲ$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ١٠$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = ١٠٠$$

$$\frac{١٠٠}{٣} = س$$



تمارين ومسائل:

(١) أحسب قيمة كل من:

$$\text{أ) لو } (٦٤) \quad \text{ب) لو } (٨١)$$

(٢) أحوّل من الصّورة الأسّيّة إلى اللّوغاريتميّة:

$$\text{أ) } ١٦ = ٢^٤ \quad \text{ب) } ١٠ = ١٠^{-١}$$

(٣) أحوّل من الصّورة اللّوغاريتميّة إلى الصّورة الأسّيّة:

$$\text{أ) لو } ١ = ٠ \quad \text{ب) لو } (٠,٠٠١) = ٣ -$$

(٤) إذا كان لو $(٧) = ٢,٨١$ ، لو $(٥) = ٢,٣٢$ ، أجد قيمة ما يأتي:

$$\text{أ) لو } (٣٥) \quad \text{ب) لو } \left(\frac{٧}{١٠}\right)$$

(٥) أجد قيمة كل ممّا يأتي:

$$\text{أ) لو } ٣٢ + \sqrt{٢} \quad \text{ب) لو } (٨١) - \text{لو } (٩) \quad \text{ج) لو } (٥)^{-٢}$$

(٦) أحلّ المعادلات الآتية:

$$\text{أ) لو } (٧س) = \text{لو } (١٢ + ٢س) \quad \text{ب) لو } (٣ - ٢س) - \text{لو } (١ + ٢س) = ٠$$

الاقتران الأسّي (Exponential Function)

٧

أتعلم: يُسمّى الاقترانُ اقتراناً أسّيّاً إذا كان على الصورة: $ق(س) = ٢^س$ ، $٢ \neq ١$ ،
 $٢ < ٠$ ، $س \in ح$

لماذا $٢ < ٠$ ، $٢ \neq ١$ ؟ **أناقش**

أيّ من الاقترانات الآتية اقترانُ أسّيّ ؟

ألاحظُ أنّ: $ق(س) = ٢^س$ اقترانُ أسّيّ؛ لأنّ
 بينما هـ- $ق(س) = ٣^{-س}$ ليس اقتراناً أسّيّاً؛ لأنّ الأساس $٣ = -٣ > ٠$.
 وعليه فإنّ: ل $ق(س) = ٢^س$ هو اقترانٌ؛ لأنّ المتغير ليس أسّاً.
 م $ق(س) = \left(\frac{١}{٢}\right)^س$ هو اقترانٌ؛ لأنّ




أمثّلُ الاقترانَ: $ق(س) = ٢^س$ ، $س \in ح$ في المستوى الديكارتي.
 أكملُ الفراغاتِ في الجدول الآتي:



س	٣	٢	١	٠	١-	٢-
ق(س)	٨			١	$\frac{١}{٢}$	$\frac{١}{٨}$

• أعيّنُ النّقاطَ من الجدول السابق في المستوى الديكارتي، وألاحظُ شكل منحنى الاقتران:



من التمثيل البياني لمنحنى الاقتران، أتعلّم أهم خصائص

منحنى الاقتران الأسّي ($1 < p$):

(١) مدى الاقتران الأسّي هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة (ح +).

(٢) منحنى الاقتران يقطع محور الصادات في النقطة (٠، ١).

(٣) كلما زادت قيم s تزداد قيم v المناظرة لها.

هل يقطع منحنى الاقتران q محور السينات؟



أكمل الجدول الآتي لقيم s ، والاقتران $q(s)$ ، ثم أرسم منحنى الاقتران.

٣-	١-	١	٢	٣	s
	٤	٢	١	$\frac{1}{8}$	$q(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$

أعيّن النقاط على المستوى الديكارتي، وأرسم منحنى الاقتران.

• ألاحظ من الرسم أن: منحنى $q(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$ هو انعكاس لمنحنى الاقتران $h(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$ في محور الصادات، أوضح ذلك جبرياً.

• من التمثيل البياني للاقتران في النشاط السابق، ألاحظ أهم خصائص الاقتران الأسّي:

$q(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$ ، $0 < p < 1$ وهي:

(١) مدى الاقتران الأسّي هو:

(٢) يقطع منحنى الاقتران محور الصادات في النقطة:

(٣) كلما زادت قيم s ، فإن قيم v المناظرة لها

أكمل الفراغات في الجدول الآتي:



س	٣	٢	٠	٢-	٣-
ص = ق (س)	٢٩		٥	$٢ \frac{١}{٣}$	$٢ \frac{١}{٩}$

- أعيّن النقاط في الجدول السابق على المستوى الديكارتي، وأرسم منحنى الاقتران.
 - ألاحظ أن: الاقتران ق(س) = $٣ + ٢$ هو انسحاب لمنحنى الاقتران ه(س) = ٣ وحدتين إلى الأعلى.
- أتعلم: يمكن تطبيق جميع التحويلات الهندسية التي تعلمتها على الاقتران الأسّي.

الاقتران الأسّي الطبيعي

الاقتران الأسّي الطبيعي: هو اقتران أسّي يكون أساسه العدد هـ، حيث هـ عدد غير نسبي له أهمية خاصة في الرياضيات ويسمى العدد النيبيري نسبة إلى (John Napier) ويساوي تقريباً ٢,٧١٨٢٨

أكمل الجدول الآتي لقيم س، ق(س) للاقتران ق(س) = هـ^س، باستخدام الآلة الحاسبة، ثم أرسم منحنى الاقتران:



س	٣	٢	١	$\frac{١}{٢}$	٠	١-
ق(س)		٧,٣٩		١,٦٥		

									١٠	
									٨	
									٦	
									٤	
									٢	
									٠	
									١	
									٢	
									٣	
									٤	
									٥	
									٢-	
									١-	
									٢-	
									٣-	
									٤-	

تمارين ومسائل:

(١) أيُّ من الاقتارات الآتية يُعدُّ اقتراناً أُسسياً؟ مع بيان السبب.

أ (ق(س) = s^5)

ب (م(س) = s^{-4})

ج (هـ(س) = s^2)

د (ص(س) = $(s-2)^3$)

هـ (ص(س) = $(\frac{2}{3})^s$)

(٢) أمثلُ منحنى الاقتارات الآتية في المستوى الديكارتي، وأجدُ مدى كل اقتران منها:

أ (ص(س) = $s^3 - 2$)

ب (ص(س) = $s - 5$)

ج (ص(س) = s^{-4})

د (ص(س) = $(\frac{1}{4})^{-s}$)

مهمة تعليمية:

(١) استخدمُ منحنى ق(س) = h^s ، والتحويلات الهندسيّة المناسبة لرسم الاقتارات الآتية:

أ (ق(س) = h^{-s})

ب (ق(س) = $h^3 - 3$)

ج (ق(س) = $h^{(s-1)}$)

(٢) أجدُ قيمة كلِّ من: h ، ب لمنحنى ق(س) = $h(3)^s + b$ ، الذي يمرُّ بالنقطتين: (٣، ١)، (٢، ٠).

الاقتران اللوغاريتمي (Logarithmic Function)

٨

أجد قيمة ما يأتي:

$$\log_4 64 = \dots\dots\dots$$

$$\log_{10} \dots\dots\dots = 10$$

$$\log_8 \dots\dots\dots = 10 \quad \log_3 \dots\dots\dots = 3 \quad \log_{49} \frac{1}{7} = \dots\dots\dots$$



أتعلم: الاقتران على الصورة $q(s) = \log_s$ ، حيث $0 < s \neq 1$ ، $s < 0$ يُسمى اقتراناً لوغاريتمياً.

أناقش لماذا $0 < s \neq 1$ ؟



ملحوظة: من اللوغاريتمات الأكثر شيوعاً اللوغاريتم ذو الأساس ١٠، ويُسمى اللوغاريتم العادي، ويُكتب عادةً على الصورة \log ، $s < 0$ (لا يُكتب له الأساس ١٠). وإذا كان الأساس العدد e يُسمى اللوغاريتم الطبيعي، ويُكتب على الصورة: $q(s) = \ln$.


أكوّن جدولاً لقيم s ، $q(s)$ المناظرة لها، للاقتران $q(s) = \log_s$ ، ثم أرسّم منحنى الاقتران.

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$		١		٤	٨	s
٣-	٢-		١		٣		$q(s) = \log_s$



$$\text{أتذكّر أنّ: لو } \frac{1}{2} = 2^{-1} \text{ لأن } \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2}.$$

أعيّنُ النقاط في المستوى البياني، وأرسمُ منحنى الاقتران ، كما هو في الشكل (٣-٢):



من منحنى الاقتران $ص = لو س$ ، ألاحظُ خصائصَ الاقتران $ص = لو س$ ، حيث $١ < ٢$:

- مجال الاقتران اللوغاريتمي هو: ومداه هو:
- نقطة (أو نقاط) تقاطع منحنى الاقتران مع محوريّ الإحداثيات هي:
- كلما زادت قيمُ $س$ فإنَّ قيمَ $ص$ المناظرة لها


أرسم منحنى $ص = لو س$ على المستوى المرسوم عليه منحنى الاقتران $ص = لو س$ ثم أقرنُ بين منحنَيّ الاقترانين.



أتعلّم: بشكلٍ عام، يُمكنُ تطبيقُ جميعِ التحويلات الهندسيّة التي تعلمتها على الاقتران اللوغاريتمي.

مثال(١): بالاعتماد على منحنى الاقتران الأسّي الطبيعي ل(س) = $ه س$ ، وخصائص منحنى الاقتران اللوغاريتمي، أرسمُ منحنى الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي ق(س) = $لو س$

الحلّ: عرفت من النشاط السابق أن منحنى الاقتران ق(س) = $لو س$ ، هو انعكاسٌ لمنحنى $ص = ه س$ في المستقيم $ص = س$.



نرسم منحنى ل(س) = هـ س، ثم نرسم انعكاسه في الخط المستقيم ص = س، فيكون لدينا منحنى الاقتران، كما هو في الشكل المجاور.

أجدُ مجالَ كلِّ من الاقترانات الآتية:

• ق(س) = لوس (س - 3) < 0

• هـ(س) = لوس (س - 1) < 0



مجال الاقتران اللوغاريتمي هو ح⁺، فإن مجال ق(س) معرفٌ عندما س - 3 < 0 .
مجال ق(س) هو :

أما مجال هـ(س) فهو معرفٌ عندما س - 1 < 0 .
وعليه فإن: مجال هـ(س) هو :

تمارين ومسائل:

(1) مستعيناً بالتحويلات الهندسية ومنحنى الاقتران ق(س) = لوس، أمثلُ الاقترانات الآتية في المستوى الديكارتي:

أ) هـ(س) = لوس - 1

ب) ل(س) = لوس (س + 2)

ج) م(س) = -لوس (س + 1)

(2) أجدُ مجالَ كلِّ من الاقترانات الآتية:

أ) ق(س) = لوس (س - 5)

ب) ق(س) = لوس √(3 - س)

الارتباط الخطي (Linear Correlation)


٩

قام قيس بجمع بيانات حول أطوال مجموعة من طلبة الصف العاشر، وكتلتهم، فكانت كما في الجدول الآتي:



١٥٨	١٦٧	١٥٠	١٦٢	١٥٥	١٦٠	١٦٥	١٦٠	١٧٠	الطول بالسنتيمتر
٥٦	٦٨	٥٥	٦٠	٥٨	٦٠	٦٢	٦٥	٧٠	الكتلة بالكيلوغرام

أمثلُ شكل الانتشار لهذه البيانات:



- هل توجد علاقة بين طول الإنسان وكتلته؟
- هل يمكنُ رسمُ مستقيم يمرُّ بمعظم النقاط؟

أتعلمُ: إذا أمكنَ رسمُ مستقيم يمرُّ بمعظم النقاط في شكل الانتشار، فإن العلاقة بين المتغيرين خطية، وتسمى هذه العلاقة الارتباط الخطي.

- هل بالإمكان تحديد قيمة عددية لقوة الارتباط بين المتغيرين؟

أستنتج: شكل الانتشار يفيد في تحديد ما إذا كانت هناك علاقة، ونوعها خطية، أو غير خطية بين متغيرين، ولكن لا يكفي للحكم على قوة الارتباط بين المتغيرين؛ لأنَّ تقديره يختلف باختلاف الشخص الذي يقوم بالحكم على قوة الارتباط؛ ولذلك يجبُ استخدامُ طريقةٍ أكثر دقة، يتمُّ بواسطتها تحديدُ قيمةٍ عدديةٍ لقوة الارتباط بين المتغيرين، وهي ما يسمَّى معامل الارتباط، وهذا ما سيتم تعلمه في الدرس القادم.

تمارين ومسائل:

١) يمثل الجدول الآتي علامات مجموعة من الطلبة في مبحثي الفيزياء (س)، والكيمياء (ص).
أرسم شكل الانتشار، وأبين نوع الارتباط.

س	٥	٩	٨	١٢	١٠	١١	٢	٤
ص	٧	١٠	٨	١٥	٩	١٣	٤	٦

٢) في الجدول الآتي أعمار مجموعة من الأشخاص (س)، وعدد الساعات اليومية التي يمارسون فيها التمارين الرياضية (ص):

س	٣٠	٢٥	٢٢	٢٠	٣٥	٤٠	٥٠	٥٥	٦٠
ص	٣	٢	١,٥	١	٤	٥	٣,٥	٢	١

- أرسم شكل الانتشار لهذه البيانات.
- هل يوجد ارتباط خطي بين عمر الشخص وعدد الساعات اليومية التي يقضيها في ممارسة التمارين الرياضية؟

معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)

١٠

تعريف: إذا كانت s ، v مجموعتين من القيم المتناظرة فيعرفُ معامل ارتباط بيرسون r كما يأتي:

$$r = \frac{\sum_{k=1}^n s_k v_k - n \bar{s} \bar{v}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n s_k^2 - n \bar{s}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2 - n \bar{v}^2}}$$

حيث: \bar{s} الوسط الحسابي لمجموعة قيم s ، \bar{v} الوسط الحسابي لمجموعة قيم v ،
 n عدد القيم.

خالد ورفاقه في الصف العاشر، يعيشون في حيّ الياسمين في نابلس، استلموا علاماتهم المدرسيّة، بعد اختبارات الشهرين، فأرادوا دراسة العلاقة بين علاماتهم في مبحثيّ اللغة العربية واللغة الانجليزية، من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون.



٣٠	١٥	٢٠	٢٥	٢٠	اللغة العربية س
٣٠	٢٠	١٨	٢٢	٢٥	اللغة الانجليزية ص

أكمل الجدول الآتي

س	ص	س ^٢	ص ^٢	س ص
٢٠	٢٥			
٢٥	٢٢		٤٨٤	
٢٠	١٨	٤٠٠		
١٥	٢٠			
٣٠	٣٠			٩٠٠
١١٠	١١٥		٢٧٣٣	
المجموع				

$$\dots = \sum_{ك=١}^{\sim} س ص$$

$$\dots = \sum_{ك=١}^{\sim} ص$$

$$\dots = \sum_{ك=١}^{\sim} س^٢$$

• أحسب:

$$\dots = \overline{ص}$$

$$\dots = \overline{س}$$

• أحسب معامل ارتباط بيرسون:

$$r = \frac{٢٣ \times ٢٢ \times ٥ - ٢٦١٠}{\sqrt{(٢٣) \times ٥ - ٢٧٣٣} \sqrt{(٢٢) \times ٥ - ٢٥٥٠}}$$

$$\dots = r$$

أتعلم: $-1 \leq r \leq 1$

تمارين ومسائل:

(١) حسبِ نائِرٍ معدَّلِ درجاتِ الحرارةِ في قريته، في الأسابيعِ الثمانيةِ من شهريِّ كانونِ أولٍ وكانونِ ثاني، وعددِ أسطواناتِ الغازِ التي تستهلكُها أسرتهُ للتدفئةِ في كلِّ أسبوعٍ، فكانتِ على النحوِ الآتي:

٨	١٠	٢-	٠	١٢	٨	٥	١-	درجة الحرارة س
٢	١	٣	٢	١	٢	٢	٣	عدد أسطوانات الغاز ص

أحسبُ معاملَ ارتباطِ بيرسون.

(٢) قام طلبةُ الصفِّ العاشرِ الأساسيِّ في مدرسةِ المجدلِ الثانوية، بدراسةِ العلاقةِ بين عددِ أفرادِ الأسرةِ لدى طلبةِ الصفِّ، وكميةِ استهلاكِ الماءِ شهرياً، فجمعوا البياناتِ، وحصلوا على النتائجِ الآتية، علماً بأنَّ عددَ الأسرِ خمسٌ. أحسبُ معاملَ ارتباطِ بيرسون.

$$20 = \sum_{k=1}^n s$$

$$110 = \sum_{k=1}^n v$$

$$490 = \sum_{k=1}^n s v$$

$$90 = \sum_{k=1}^n s^2$$

$$2700 = \sum_{k=1}^n v^2$$

مهمة تقويمية:

أحسبُ معاملَ ارتباطِ بيرسون للبياناتِ في الجدولِ الآتي:

١٥	٦	١٦	٥	٨	١٠	س
١٢	٦	١٥	٥	٧	٩	ص

الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression)

١١

تعريف:

تسمى المعادلة $\hat{ص} = ا + ب$ التي تربط بين قيم المتغيرين $ص$ ، $س$ معادلة خط انحدار $ص$ على $س$

$$\text{حيث: } ا = \frac{\sum_{ك=١}^ن س ك ص ك - ن \bar{س} \bar{ص}}{\sum_{ك=١}^ن س ك^٢ - ن \bar{س}^٢} \quad \text{و} \quad ب = \bar{ص} - ا \bar{س}$$

$\bar{س}$ الوسط الحسابي لقيم المتغير $س$

$\bar{ص}$ الوسط الحسابي لقيم المتغير $ص$

أحسب كلاً من: $\bar{س}$ ، $\bar{ص}$ للبيانات في الجدول الآتي:

٥	٢-	٨	٦	٣	س
٤-	٦	٠	١	٧	ص



$$\bar{س} = \dots\dots\dots ، \bar{ص} = \dots\dots\dots$$

أكمل الجدول الآتي:

س	ص	س ^٢	س ص
٣	٧		٢١
٦	١	٣٦	
٨	٠		
٢-	٦		
٥	٤-	٢٥	٢٠-

أجد معادلة خط الانحدار: $\hat{ص} = أس + ب$

أحسب: قيمة $أ = \dots$ ، وقيمة $ب = \dots$

معادلة خط الانحدار: $\hat{ص} = \dots + \dots$

أتعلم: يمكن استخدام معادلة الانحدار في حساب قيم ص إذا علمت قيم س.

تمارين ومسائل:

(١) يُمثّل الجدول الآتي عددَ ساعاتِ الدراسةِ اليوميّة، ومعدّلَ الثانويّةِ العامّة، لدى مجموعةٍ من الطلبة:

٣	٥	٦	٤	٢	عدد ساعات الدراسة س
٧٠	٧٠	٨٠	٧٠	٦٠	معدل الثانوية العامة ص

- أجدُ معادلةَ خطِّ انحدارٍ ص على س.
- إذا درس طالب ٨ ساعات يومياً، فكم تتوقع المعدل الذي سيحصل عليه؟

مهمة تقويمية:

أرسمُ شكلَ الانتشارِ، وأرسمُ الخطَّ المستقيمَ، الذي يقعُ عليه أكبرُ عددٍ من النّقاطِ للبيانات، في الجدول الآتي:

١	٢	٣	٥	٣	١	س
٧	٥	٧	٦	٧	٣	ص

مبدأ العدّ الأساسي:

إذا أمكننا إجراء عملية ما على خطواتٍ عددها n ، بحيث تتمّ الأولى بطرقٍ عددها n_1 ، وتتمّ الثانية بطرقٍ عددها n_2 ، وهكذا حتى الخطوة الأخيرة التي تتمّ بطرقٍ عددها n_k ، فإنّ عدد الطرق الكلية التي تتمّ بها هذه العملية هي: $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

يرادُ تكوينُ مجلسٍ إدارةٍ لشركةٍ ما، مكوّنٍ من رئيسٍ، ونائبٍ رئيسٍ، وأمينٍ للصندوق، بكم طريقةٍ يمكنُ تكوينُ هذا المجلس، إذا كان عددُ الأشخاص المرشّحين ٥؟
لاختيار الرئيس، هناك ٥ طرقٍ مختلفة.

لاختيار نائب الرئيس، هناك ٤ طرقٍ مختلفة، لماذا؟

لاختيار أمين الصندوق، هناك ٣ طرقٍ مختلفة.

عدد الطرق المختلفة لتكوين المجلس = $5 \times 4 \times 3 = \dots$ طريقة مختلفة.

كم عدداً مكوّناً من منزلتين، يمكنُ تكوينه من مجموعة الأرقام: $\{3, 5, 6, 8\}$ ؟
(أ) إذا سُمحَ بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

تتمّ العملية في مرحلتين: المرحلة الأولى اختيار منزلة الآحاد، وتتمّ بـ ٤ طرق، واختيار منزلة العشرات، وتتمّ أيضاً بـ ٤ طرق. إذن عدد الطرق الكلية = $4 \times 4 = 16$ طريقة.

(ب) إذا لم يُسمحَ بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

عدد طرق اختيار منزلة الآحاد... طرق، وعدد طرق اختيار منزلة العشرات... طرق.

عدد الطرق المختلفة = $4 \times 3 = 12$ طريقة، أي أنّ: عدد الأعداد المختلفة ١٢ عدداً.

مضروب العدد:

بكم طريقةٍ مختلفةٍ يمكنُ لخمسة أشخاصٍ أن يجلسوا في خمسة أماكن في خطٍّ مستقيم؟
حسب مبدأ العدّ: عدد الطرق المختلفة هي $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ طريقةً مختلفةً.
اصطُلِحَ على كتابة حاصل الضرب $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ على الصورة $5!$ ، وتُقرأ مضروب العدد ٥.

تعريف:

إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً، فإنّ مضروب العدد n ، ويُرمز له بالرمز $n!$ حيث: $n! = n(n-1)(n-2) \dots 3 \times 2 \times 1$
 $1 = 1!$

أحسب قيمة كلِّ مما يأتي:

أ) $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = \dots$

ب) $20 = \dots = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3!}$

ج) $\frac{8!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{1 \times 2 \times 3 \times 5!} = \dots$



نشاط ٣

أكتب $\frac{n!}{(n-2)!}$ في أبسط صورة.

$\dots = \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!}$

قيمة المقدار، عندما $n = 5$ تساوي



نشاط ٤

تمارين ومسائل:

١) يقدم أحد المطاعم في مدينة نابلس ٣ أنواع من اللحوم، و ٤ أنواع من الحلوى، ونوعين من المشروبات. بكم طريقة يمكن لأحد مرتادي المطعم اختيار وجبة مكونة من نوع من اللحوم، ونوع من الحلوى، ومشروب؟

٢) أقيمت قطعة نقد ٣ مرات، فما عدد النتائج الممكنة؟ أكتب النتائج في مجموعة.

٣) كم عدداً مؤلفاً من ثلاث منازل، يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام: $\{ 2, 4, 6, 8 \}$ ؟

أ) إذا سُمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

ب) إذا لم يُسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

تعريف:

عدد تباديل n من العناصر مأخوذةً جميعاً في كل مرة، هو $n!$ ، ويُرمز له بالرمز $ل(n, n)$ ، حيث $n \in \mathbb{N}^+$

$$ل(n, n) = n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

أجد قيمة: $ل(6, 6)$.

$$ل(6, 6) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

$$ل(5, 5) = \dots \dots \dots \text{ ماذا نلاحظ؟}$$



نشاط

أجد عدد الأعداد المكوّنة من منزلتين، التي يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ، إذا لم يُسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

ألاحظ أنّ المطلوب هو عدد الترتيبات الثنائية لمجموعة الأرقام هذه، بشرط عدم التكرار، ويساوي $\dots \times \dots = \dots$



نشاط

وهذا ما يُسمّى التباديل الثنائية لمجموعة فيها n عناصر، وبشكلٍ عام، فإنّ عدد التباديل الرائيّة لمجموعة مكوّنة من n من العناصر، ويُرمز له بالرمز $ل(n, r)$ ،

$$\text{يساوي } \frac{n!}{(n-r)!} \text{ حيث } n, r \text{ عددان طبيعيان، } r \leq n$$

أجد قيمة كلِّ ممّا يأتي:

$$\text{أ) } ل(3, 5) = \frac{5!}{(3-5)!} = \dots$$

$$\text{ب) } ل(3, n) = \frac{n!}{(3-n)!} = \dots$$



نشاط

أتعلم: يمكن كتابة ل (ن، م) على الشكل: $ل(ن، م) = (1-n)(2-n)\dots(3-n)\dots(1+m-n)$.

أتحقق مما يأتي:

أ) $ل(1، ن) = \frac{ن!}{ن!} = \dots = ن$

ب) $ل(0، ن) = \frac{ن!}{ن!} = \dots = 1$

ج) $ل(ن، ن) = \dots = ن!$



بكم طريقة يمكن تشكيل لجنة مكونة من رئيس، ونائب رئيس، وأمين سر من بين سبعة أشخاص؟

عدّد الطرق التي يمكن تشكيل اللجنة بها هي:

ل(3، 7) = ... × ... × ... = 210 طرق مختلفة.



تمارين ومسائل:

(1) أحسب قيمة ما يأتي:

أ) ل(4، 6) ب) $\frac{ل(2، 9)}{ل(0، 9)}$

(2) أراد أحمد وإخوانه الثلاثة الذهاب إلى المسجد الأقصى، واتفقوا على أن يدخل كل منهم من بابٍ مختلفٍ من أبواب القدس السبعة. بكم طريقة مختلفة يمكن للإخوة الأربعة الوصول إلى المسجد الأقصى؟

(3) أجد قيمة ن في كل مما يأتي:

أ) ل(2، ن) = 56 ب) ل(ن، 3 - 2) = 6

مهمة تقويمية:

أعبّر عن كل مما يأتي بالصورة ل (ن، م)

أ) $9 \times 8 \times 5 \times 6 \times 7$ ب) 2020 ج) $ن(ن - 3 + 2)$

تعريف:

عدد التوافيق الرائيّة لمجموعة فيها n من العناصر، ويُرمزُ له بالرمز:

$$r \leq n, \quad \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!} = \binom{n}{r}$$

لدى معرضٍ سيّاراتٍ ٦ أنواعٍ من السيارات، يريدُ صاحبُ المعرضِ اختيارَ ٤ منها، لعرضها للزبائن.

أجدُ عددَ الطرقِ التي يمكنُ بها الاختيار.



بما أنّ إعادة الترتيب لا تعطي نتيجة جديدة، أي أنّ الترتيب غير مهم.

$$\dots = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{4!2!} = \binom{6}{4} = \text{إذن: عددُ الطرقِ يساوي}$$

$$1 = \binom{n}{n} \quad (\text{ب})$$

$$1 = \frac{n!}{n!0!} = \binom{n}{0} \quad (\text{أ: أتعلم})$$

$$\binom{n}{r-n} = \binom{n}{r} \quad (\text{د})$$

$$n = \binom{n}{1} \quad (\text{ج})$$

تمارين ومسائل:

$$(1) \text{ أحسب ما يأتي: (أ) } \binom{9}{5} \quad (\text{ب}) \binom{9}{4} \quad (\text{ج}) \binom{75}{1}$$

$$(2) \text{ أجد قيم } n \text{ في كلِّ من الحالات الآتية: (أ) } 3 = \binom{n}{2} \quad (\text{ب}) \binom{n}{4} = \binom{n}{9}$$

مهمة تفويمية:

(1) بكم طريقة يمكنُ تكوينُ فريقٍ لكرة السّلة، يتمُّ اختياره من بين ثمانية لاعبين؟

(2) صفٌّ مكوّنٌ من ٩ طلابٍ، و٧ طالباتٍ، يُرادُ تشكيلُ لجنةٍ مكوّنةٍ من ٣ طلابٍ، و٤ طالباتٍ، بكم طريقةٍ مختلفةٍ يمكنُ تشكيلُ اللجنة؟

نموذج اختبار ذاتي

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي :

(١) أحد الاقترانات الآتية اقتران أسي :

أ) $(٢)^س$ ب) $س^٢$ ج) $(٣-)^س$ د) $(\frac{١-}{٣})^س$

(٢) منحني الاقتران ق(س) = (٢)^س:

أ) متزايد ويمر بالنقطة (٠، ١) ب) متناقص ويمر بالنقطة (٠، ١)

ج) متزايد ويمر بالنقطة (٠، ٢-) د) متناقص ويمر بالنقطة (٠، ٢-)

(٣) إذا كان ن! = ٢٤ فإن ل(ن٢، ٣) =

أ) ٢٤ ب) ٥٠٤ ج) ٤ د) ٣٣٦

السؤال الثاني: أوجد قيمة ما يأتي:

(١) لو٢٠ + لو٥

(٢) $[١ - \sqrt{٢}]$

(٣) $(\frac{٧}{٣}) + -(\frac{٧}{٤})$ ل(٧، ١)

السؤال الثالث: إذا كان مجموع مربعات فرق الرتب للمتغيرين (س، ص) لعينة حجمها ٦ يساوي ٢٤ احسب معامل ارتباط سبيرمان موضحاً نوع الارتباط ومدى الارتباط.

السؤال الرابع:

أ) بالاعتماد على رسم ق(س) = هـ ارسم منحنى م(س) = هـ - ٣ ، موضحاً التحويلات الهندسية .

ب) الجدول الآتي يمثل العلاقة بين المتغيرين س ، ص ، بالاعتماد على الجدول أوجد .

- معامل ارتباط بيرسون

- معادلة خط انحدار ص على س

ص	س				
٤	١-				
٥	٢-				
٢	١				
١	٢				
٢-	٥				

السؤال الخامس: أ) لديك المجموعة: س { ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٤ ، ٧ } ، كم عدداً زوجياً مؤلفاً من ٣ منازل يمكن


تكوينه من المجموعة س إذا لم يسمح بتكرار الرقم؟

ب) إذا كان ق(س) = أس + ب، وكان منحنى ق(س) يمر بالنقطة (٠ ، ٣) ، وكان (أ) = ١٥ =

أوجد قيمة الثوابت أ ، ب .

الزاوية في الوضع القياسي The Angle in Standard Position


١٥



- في الشكل المجاور
- ضلع الابتداء للزاوية θ و ب هو:
 - ضلع الانتهاء لها هو:, لماذا؟
 - اتجاه حركة ضلع الابتداء لينطبق على ضلع الانتهاء هو:
 - تُسمى زاوية θ و ب زاويةً موجّهة.



أتعلم: الزاوية الموجّهة: هي زاويةً يتحدّد اتجاهها باتجاه دوران ضلع الابتداء لينطبق على ضلع الانتهاء، وتكون الزاوية الموجّهة زاويةً موجبةً إذا كان اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة، وتكون الزاوية الموجّهة سالبةً إذا كان اتجاه الدوران مع عقارب الساعة.




في الشكل المجاور:

$$\Delta \text{س} = 60^\circ,$$

$$\Delta \text{ص} = \dots\dots\dots$$

$$\Delta \text{ص} = 280^\circ, \Delta \text{س} = \dots\dots\dots$$






أُسْمِي الزاوية الموجهة في الشكل
 ضلع الابتداء لها هو $و$ ، ضلع الانتهاء
 لها هو: ، رأس الزاوية هو:



أتعلّم: تكون الزاوية في الوضع القياسي إذا كان رأسها نقطة الأصل، وانطبق ضلع الابتداء على محور السينات الموجب.



في الشكل المجاور: الزاوية الموجهة ع و د
 ليست في وضع قياسي؛ لأنّ
 • الزاوية الموجهة في الوضع
 القياسي؛ لأنّ
 • الزاوية الموجهة د و ر في، لأنّ




أستنتج أنّ:

- إذا كانت $\theta > 90^\circ$ زاوية في الوضع القياسي، وكان $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ، فإنّ ضلع انتهائها يقع في الربع الأول.
- إذا كانت $\theta > 180^\circ$ زاوية في الوضع القياسي، وكان $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ، فإنّ ضلع انتهائها يقع في الربع الثاني.



نشاط ٥

أرسمُ الزوايا التي قياسها 120° ، 225° ، 300° ، 60° في الوضع القياسي، ثم أحددُ الربع الذي تقع فيه:



تقع الزاوية التي قياسها 120° في الربع

.....

بينما تقع الزاوية التي قياسها 225° في الربع

تقع الزاوية التي قياسها 300° في الربع

تقع الزاوية 60° في الربع

أتعلم: عند رسم زاوية في الوضع القياسي فإن ضلع انتهائها يحدد موقعها في المستوى الديكارتي.



نشاط ٦

أرسمُ الزوايا التي قياسها:

90° ، 180° ، 90° .


ينطبق ضلع انتهاء الزاوية التي قياسها 90°

على محور

بينما ينطبق ضلع انتهاء الزاوية التي قياسها 180°

على

90° فينطبق على




تُسمى الزاوية التي في الوضع القياسي، وينطبق ضلع انتهائها على أحد المحاور الإحداثية زاوية رُبعية.


أعطِ ثلاثة أمثلة لزاويا ربعية:

تمارين ومسائل:

(١) ما قيمة s التي تُمثّل قياس الزاوية في كلٍّ من الأشكال الآتية:




(٢) أميّر الزوايا التي في الوضع القياسي:



(٣) أحمّد الربع من المستوى الذي تقع فيه الزوايا الآتية:

120° ، 130° ، 250° ، 320° ، 450°

في الشكل المجاور، تم تقسيم الدائرة إلى ٣٦٠ قوساً متساوياً في الطول، فإن الزاوية المركزية التي تقابل كل قوس، قياسها ١°. والزاوية التي تقابل ٥٠ قوساً يكون قياسها°.




والدرجة الواحدة تقسم إلى ٦٠ جزءاً أصغر منها، وهو الدقيقتان وتُكتَبُ على الصورة: ١° = (...)

والدقيقة الواحدة تُقسم إلى ٦٠ جزءاً أصغر منها، وهو الثانية، وتُكتَبُ على الصورة: ١' = ٦٠''

الزاوية ٣٢,٦° = ٣٢° و ٠,٦ × ٦٠ = (...)'
٣٦' = ٣٢°

تعريف: يُسمّى قياس الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني القياس الستيني للزاوية.

لماذا سُمّي القياس الستيني بهذا الاسم؟



في الشكل المجاور، دائرة مركزها م ونصف قطرها وحدة واحدة.

طول القوس م = طول نصف قطر الدائرة

طول القوس الذي يقابل الزاوية المركزية التي قياسها (س)

في الشكل =



تعلّم: يكون قياس الزاوية س بالقياس الدائري = ١ راديان (Radian) ونرمز له بالرمز ١^ر

تعريف: الزاوية النصف قطريّة: هي زاوية مركزية في دائرة يقابلها قوس طوله يساوي طول نصف قطر الدائرة، ويُرمز لها بالرمز (١^ر)، وهي وحدة قياس الزاوية بالقياس الدائري للزوايا.

محيط الدائرة = 2π ← محيط دائرة الوحدة =

الدورة الكاملة = 360° يقابلها 2π

← π يقابلها درجة

باستخدام التقريب ($\pi = 3,14$) نستنتج أن: $1 = 3,14^\circ$

أكمل: $3 = \dots^\circ$ ، $1 = \dots^\circ$



أولاً: أحوّل قياس الزوايا الآتية من درجات إلى زاوية نصف قطرية (راديان):

90° ، 120° ، 225°

• 90° :

للتحويل من درجات إلى دائري: π يقابلها 180°

90 درجة ← هـ بالتقدير الدائري

$$هـ = \frac{90^\circ}{180^\circ} \times \pi = \frac{1}{2} \pi$$

$$\bullet \quad 120^\circ = \frac{120^\circ}{180^\circ} \times \pi = \dots$$

$$\bullet \quad 225^\circ = \dots$$

ثانياً: أحوّل قياس الزوايا من دائري إلى درجات:

$$\frac{5}{6} \pi ، \frac{3}{4} \pi ، \frac{15}{18} \pi$$


للتحويل من دائري إلى درجات: π يقابلها 180°

$$\frac{5}{6} \pi \leftarrow \text{س بالدرجات.}$$

$$\text{س} = \frac{180^\circ}{\pi} \times \frac{5}{6} \pi = 150^\circ$$



أتعلم: يُقال لزاويتين أنّهما متكافئتان: إذا كان لهما ضلع الابتداء نفسه، وضلع الانتهاء نفسه.



في الشكل المجاور:
 θ تكافئ $\frac{\pi}{2} + \theta$

وبشكلٍ عام:

θ تكافئ $\frac{\pi}{2} + \theta$ ، θ بالقياس الدائري.

θ تكافئ $\theta + 360^\circ$ ، θ بالقياس الستيني ، حيث n عدد صحيح.

أجدُ ثلاث زوايا مكافئة لكلِّ من الزوايا التي قياسها: $\frac{\pi}{4}$ ، 60° .

الزاوية التي قياسها 60° تكافئ الزاوية التي قياسها $60^\circ + 360^\circ = 420^\circ$ ، $n = 1$

الزاوية التي قياسها 60° تكافئ الزاوية التي قياسها $60^\circ + 2 \times 360^\circ = 780^\circ$ ، $n = 2$

الزاوية التي قياسها 60° تكافئ الزاوية التي قياسها $60^\circ + 3 \times 360^\circ = 1080^\circ$ ، $n = 3$

الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{4}$ تكافئ عندما $n = 1$

الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{4}$ تكافئ $\frac{\pi}{4} - 360^\circ$ عندما $n = -1$



تمارين ومسائل:

مهمة تقويمية:

(١) أحوّل القياسات الآتية من الدرجات إلى راديان: 240° ، 90° ، 420° ، 135°


(ب) أحوّل القياسات الآتية من راديان إلى درجات: (٢) أعطِ زاويتين: قياس إحداهما موجب، والآخر سالب،

مكافئتين لكلِّ من الزوايا التي قياسها: $\frac{\pi}{6}$ ، $\frac{\pi}{3}$ ، $\frac{\pi}{12}$ ، $\frac{\pi}{4}$ ، $2,5$

(٢) أوجد ثلاث زوايا تكافئ الزاوية التي قياسها 0.5° . 120° ، $\frac{\pi}{3}$

الاقترانات المثلثية

Trigonometric Functions



في المثلث القائم الزاوية Δ ب ج م ، النسب المثلثية للزاوية الحادة التي قياسها هـ

$$\text{جاه} = \frac{\text{م}}{\text{ج}} ، \text{جتاه} = \dots\dots\dots ، \text{ظاه} = \dots\dots\dots$$



نشاط ١



فكر

هل يمكن إيجاد النسب المثلثية للزوايا التي قياسها أكبر من 90° ،

أو قياسها سالب؟


أتعلم: الدائرة التي مركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها وحدة واحدة، تُسمى دائرة الوحدة.

$$\text{معادلة دائرة الوحدة: } \text{س}^2 + \text{ص}^2 = 1$$

لتكن هـ زاوية في الوضع القياسي، إذا قطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة في النقطة ب (س، ص). أجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية هـ.



نشاط ٢



$$\text{جاه} = \frac{\text{ص}}{1} = \text{ص} ، \text{جتاه} = \dots\dots\dots ، \dots\dots\dots = \text{ظاه}$$


$$\dots\dots\dots = \text{ظاه}$$

بشكل عام: إحداثيات النقطة ب (جتاه ، جاه).

أتعلم: إذا قطع ضلعُ انتهاء الزاوية هـ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب (س،ص)، فإنه يمكن تعريفُ الاقترانات المثلثية جاه = ص ، جتاه = س ، ظاه = $\frac{ص}{س}$ ، $س \neq ٠$ وتُسمّى هذه الاقترانات، الاقترانات المثلثية الأساسية للزوايا هـ.

ملاحظة: إذا كانت النقطة ب (س ، ص) تقع على دائرة الوحدة،

فإن $١ \geq س \geq -١$ ، و $١ \geq ص \geq -١$ ، وعليه فإن $١ \geq جتاه \geq -١$ و $١ \geq جاه \geq -١$



أجدُ الاقترانات المثلثية للزوايا الربعية:

٠° ، ٩٠° ، ٢٧٠° .

• ضلع انتهاء الزاوية التي قياسها ٠° يقطع

دائرة الوحدة في النقطة (١، ٠)، وينتج جا $٠^\circ =$

..... ، جتاه $٠^\circ =$ ، ظاه $٠^\circ =$

• ضلع انتهاء الزاوية التي قياسها ٩٠° يقطع دائرة الوحدة

في النقطة (..... ،)، وينتج جا $٩٠^\circ =$

، جتاه $٩٠^\circ =$ ، ظاه $٩٠^\circ =$

• ضلع انتهاء الزاوية التي قياسها ٢٧٠° يقطع دائرة

الوحدة في النقطة (..... ،)، وينتج جا $٢٧٠^\circ =$

..... ، جتاه $٢٧٠^\circ =$ ، ظاه $٢٧٠^\circ =$

• أكملُ الجدول الآتي:

قياس الزاوية الربعية (س°)	جاس	جتاس	ظاس
صفر	صفر		
٩٠°			
١٨٠°		-١	صفر
٢٧٠°			
٣٦٠°		١	٠



٤

نشاط

إذا قطع ضلعُ انتهاء الزاوية التي قياسها ه° دائرة الوحدة في النقطة P $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ فإنّ:

- جاه = $\frac{1}{2}$ ؛ لأن الإحداثي الصادي لنقطة تقاطع ضلع انتهاءها هو
- جتا ه = ؛ لأنّ:
- ظاه =




٥

نشاط

- أرسم دائرة الوحدة
- أرسم زاويةً قياسها ه° في الوضع القياسي
- نقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية مع الدائرة هي النقطة P (س ، ص).
- تكون إشارة س موجبة، إذا وقعت النقطة P في الربع، أو الربع من المستوى.
- تكون إشارة ص موجبة، إذا وقعت النقطة P في الربع، أو الربع من المستوى.

أتعلّم: لتحديد إشارة الاقترانات المثلثية للزاوية ه حسب الربع الذي تقع فيه.


إذا كانت ه زاويةً في الوضع القياسي، النقطة P (س ، ص) تقع على ضلع انتهاءها، بعد النقطة P (س ، ص) عن نقطة الاصل =



$$\frac{ص}{ر} = \text{جاه، جاه} = \frac{ص}{ر}$$

$$\frac{س}{ر} = \text{جتاه} = \frac{س}{ر}$$

$$\frac{ص}{س} = \text{ظاه} = \frac{ص}{س} \neq \text{صفر}$$



في الشكل المجاور، أجد قيم الاقترانات المثلثية جاه ، جتاه ،
ظاه:


ر =

جاه = ، جتاه =


ظاه =




لكل زاوية قياسها هـ درجة في المستوى زاوية اسناد قياسها هـ' درجة، أكمل:




هـ' =



هـ' = هـ - ٠.٨١ °



هـ' =



هـ' = هـ



أتعلم: زاوية إسناد الزاوية (هـ): هي الزاوية الحادة (> هـ) الناتجة من اتحاد ضلع انتهاء الزاوية (> هـ) ومحور السينات.

قيم الاقترانات المثلثية لزاوية الإسناد هي ذاتها قيم الاقترانات المثلثية للزاوية الأساسية، بينما تحدد إشارة تلك القيمة موضع ضلع انتهاء الزاوية الأساسية.

أذكر قيم الاقترانات المثلثية للزوايا الخاصة، وأكمل الجدول الآتي:



قياس الزاوية (س)	جاس	جتاس	ظاس
°٣٠	٠,٥		
°٤٥			١
°٦٠			√٣/٢



أولاً: أجد قيمة جا 120°
 الحل: الزاوية في الوضع القياسي والتي قياسها 120° تقع في الربع
 إشارة جا 120° موجب.
 قياس زاوية الإسناد هـ = $180^\circ - 120^\circ = \dots\dots\dots$
 جا $120^\circ = \text{جا } 60^\circ = \dots\dots\dots$

ثانياً: أجد قيمة جتا 240°

الحل: الزاوية في الوضع القياسي، التي قياسها 240° تقع في الربع
 إذن: إشارة جتا 240°
 قياس زاوية الإسناد (هـ) =
 إذن: جتا $240^\circ = \dots\dots\dots$ - جتا =



أجد جا 30° -
 الزاوية في الوضع القياسي، التي قياسها 30° تقع في الربع ،
 إشارة جا 30° هي:
 قياس زاوية الإسناد (هـ) =
 جا $30^\circ = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

• أجد ظا $\frac{\pi}{4}$
 الزاوية في الوضع القياسي، التي قياسها $\frac{\pi}{4}$ تقع في الربع ،
 إشارة ظا $\frac{\pi}{4}$ هي:
 قياس زاوية الإسناد (هـ) = ، إذن: ظا $\frac{\pi}{4} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$



أجد قيمة 2° جا 30° جا 30° وأقارنه بقيمة جا 60°
 $2^\circ \text{ جا } 30^\circ \text{ جا } 30^\circ = \dots \times \dots \times 2 = \dots$
 جا $60^\circ = \dots$ ماذا تلاحظ؟
 أجد:
 • $2^\circ \text{ جا } 45^\circ \text{ جا } 45^\circ = \dots \times \dots \times 2 = \dots$
 • جا $90^\circ = \dots$ ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟

أستنتج أن: $2^\circ \text{ جا } 2^\circ = 2^\circ \text{ جا } 2^\circ$



أجد قيمة جتا 30° - جا 30° وأقارنه بقيمة جتا 60°
 $2^\circ \text{ جتا } 30^\circ - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dots$
 جتا $60^\circ = \dots$ ماذا تلاحظ؟




أجد ناتج جتا 15° - جا 15° دون استخدام الحاسبة
 جتا 15° - جا $15^\circ = \dots$ جتا $15^\circ = \dots$

أستنتج أن:
 $2^\circ \text{ جتا } 2^\circ = 2^\circ \text{ جتا } 2^\circ$
 $1^\circ \text{ جتا } 2^\circ = 2^\circ \text{ جتا } 1^\circ$
 $2^\circ \text{ جتا } 1^\circ = 1^\circ \text{ جتا } 2^\circ$

تمارين ومسائل:

(١) أجد قيمة الاقترانات المثلثية الأساسية لقياسات الزوايا الآتية:
 π_5° ، $^\circ 450$ ، $^\circ 90$ -

(٢) أجد قيمة الاقترانات المثلثية الأساسية للزاوية هـ ، إذا قطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة في النقطة:



أ) $(\frac{1-}{2\sqrt{2}} , \frac{1-}{2\sqrt{2}})$ ، ب) $(0 , 1-)$ ، ج) $(-\frac{1}{2} , \frac{\sqrt{3}}{2})$

(٣) ما قيمة جا هـ ، جتا هـ ، ظا هـ في الشكل المجاور؟

(٤) أحدد إشارة ما يأتي:

جتا -135° ، ظا 84° ، جتا $\frac{\pi 2}{3}$ ، ظا $\frac{\pi 3}{4}$

(٥) أجد قيمة ما يلي دون استخدام الحاسبة ٢ جتا $22,5^\circ - 1$

مهمة تقويمية:

(١) أجد قيمة ما يلي دون استخدام الحاسبة

أ) $1 - 2 \text{ جا } \frac{\pi}{6}$ ، ب) $6 \text{ جا } \frac{\pi}{12} \text{ جتا } \frac{\pi}{12}$

(٢) أجد قياس زاوية الإسناد للزوايا التي قياساتها ما يأتي:

225° ، $\frac{\pi 2}{3}$ ، 150° ، $\frac{\pi 3}{4}$ ، 210°

(٣) أجد قيمة ما يأتي، دون استخدام الآلة الحاسبة:

جا 330° ، ، ، جا 300°

تمثيل الاقترانات المثلثية بيانياً


Graphing Trigonometric Functions

أُمثِّلُ الاقتران ق(س) = جاس في المستوى الديكارتي، أكملُ الجدول الآتي:



π_2	$\frac{\pi 11}{6}$	$\frac{\pi 3}{2}$	$\frac{\pi 5}{4}$	π	$\frac{\pi 2}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	صفر	$\frac{\pi}{2} -$	$\pi -$	قياس الزاوية س
...	...	١-	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	١	...	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	١-		ق(س) = جاس

أُعيِّنُ النِّقَاطَ من الجدول، وأرسمُ منحنى الاقتران:



ألاحظ شكل المنحنى، وأستنتج خصائصه.

- بما أن الزوايا المتكافئة لها النسب المثلثية المناظرة نفسها، فإن منحنى ق(س) = جاس يكرّر نفسه في فترات متساوية، طول كل منها π_2 . ومثل هذه الاقترانات تُسمى اقترانات دورية، ومقدار دورة هذا الاقتران $\pi_2 =$

- مجال الاقتران ق(س) = جتا س هو مجموعة الأعداد الحقيقية ح، ومداه هو [-1، 1]
 - أكبر قيمة للاقتران = وأصغر قيمة له =
 - مثل هذه الاقترانات لها سعة، وتُعرف سعة الاقتران = $\frac{\text{أكبر قيمة له} - \text{أصغر قيمة له}}{2}$
- وعليه فإن: سعة الاقتران ق(س) = جتا س = $\frac{1 - (-1)}{2} = 1$

أُمثِّل الاقتران: ق(س) = جتا س في المستوى الديكارتي، س \in ح .
 أكمل الجدول الآتي:



π_2	$\frac{\pi_{11}}{6}$	$\frac{\pi_3}{2}$	$\frac{\pi_0}{4}$	π	$\frac{\pi_2}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	صفر	$\frac{\pi}{2} -$	$\pi -$	قياس الزاوية س
...	1-	$\frac{1}{2} -$	0	1-	ق(س) = جتا س

أُعيِّن النقاط من الجدول، وأرسم منحنى الاقتران.

ألاحظ شكل المنحنى، وأستنتج خصائصه:


- مجال الاقتران ق(س) = جتا س هو، ومداه
- أكبر قيمة للاقتران =، وأصغر قيمة له =
- الاقتران ق(س) = جتا س اقتران دوري، دورته =
- سعة الاقتران = $\frac{\text{أكبر قيمة له} - \text{أصغر قيمة له}}{2}$ =



نشاط ٣
 أمثل الاقتران ق(س) = ظاس في المستوى الديكارتي.
 أكمل الجدول الآتي:

π_2	$\frac{\pi_{11}}{6}$	$\frac{\pi_3}{2}$	$\frac{\pi_4}{3}$	π	$\frac{\pi_2}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	صفر	$\frac{\pi}{2}$ -	π -	قياس الزاوية س
...	$\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ -	...	$\sqrt[3]{3}$	١	...	صفر	ق(س) = ظاس

أعيّن النّقاط من الجدول، وأكمل رسم منحنى الاقتران.



ألاحظ شكل المنحنى، وأدوّن خصائصه:

مجال ق(س) = ظاس هو مجموعة جميع الأعداد الحقيقيّة، ما عدا، ومداه هو: ح دورته =




أُمثِّلُ منحنى الاقتران ق(س) = حاس، ل(س) = جا ٢س على المستوى البياني نفسه، ثم أجدُ السَّعة والدورة للاقتران ل(س).

أُكْمَلُ الجدول الآتي:

π_2	$\frac{\pi_{11}}{6}$	$\frac{\pi_3}{2}$	$\frac{\pi_5}{4}$	π	$\frac{\pi_2}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	صفر	$\pi-$	قياس الزاوية س
...	١	...	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	صفر	...	ل(س) = جا ٢س

أُعَيِّنُ النِّقَاطَ فِي الْمَسْتَوَى الْديكارتِي، وَأُلاحِظُ التَّمثِيلَ الْبياني لِلْمَنْحَنِ:



من التمثيل البياني لمنحنى ل(س)، ألاحظُ أنّ دورة الاقتران ل(س) هي:
 بينما سعته =
 مدى الاقتران ل =

أستنتج: الاقتران الدوري ق(س) = P جا (ب س) + ج ، او الاقتران ه(س) = P جتا (ب س) + ج
 حيث: P ، ب ، ج أعداد حقيقية ، $P \neq 0$.

$$\frac{\pi^2}{|b|} = \text{دورة الاقتران}$$

$$|b| = \text{سعة الاقتران}$$

$$\text{مدى الاقتران} = [- |b| + ج ، |b| + ج]$$

لديك الاقتران ق(س) = ٢ جتا $\frac{س}{٤}$ - ٣، أجد دورته، سعته، ومداه، دون تمثيله بيانياً.



$$\dots\dots\dots = \frac{\pi^2}{|b|} = \text{دورة الاقتران}$$

$$\dots\dots\dots = \text{سعة الاقتران}$$

$$\dots\dots\dots = \text{مجال الاقتران}$$

$$\dots\dots\dots = \text{مدى الاقتران}$$

تمارين ومسائل:

(١) أمثلُ منحنيات الاقترانات المثلثية الآتية:

$$\bullet \text{ ق(س) = جا س + ٢ ، ل(س) = جتا ٢ س - ١}$$

$$\bullet \text{ م(س) = جتا (-س) ، ك(س) = جا (س + \pi)}$$

(٢) أجد: أكبر قيمة وأصغر قيمة (إن وجدت)، السعة، الدورة لكلٍ من الاقترانات الواردة في السؤال الأول.

(٣) أجد: دورة، وسعة، ومدى الاقتران: ق(س) = ٣- جتا $(\frac{س}{٤})$ ، دون تمثيله بيانياً.

مهمة تعليمية:

أ) أرسم منحنى الاقتران ق(س) = جتاس، وعلى المستوى الديكارتي نفسه أرسم منحنى الاقتران ل(س) = جا $(س + \frac{\pi}{٤})$ ، ماذا تلاحظ؟


ب) أرسم منحنى الاقتران ق(س) = جاس، وعلى المستوى الديكارتي نفسه أرسم منحنى الاقتران ل(س) = جتا $(س - \frac{\pi}{٤})$ ، ماذا تلاحظ؟

ورقة عمل:

السؤال الأول:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

(١) ما قيم s ، v الممكنة في الشكل المجاور؟



(أ) $(60^\circ, 300^\circ)$ (ب) $(60^\circ, -300^\circ)$ (ج) $(-60^\circ, 300^\circ)$ (د) $(-60^\circ, -300^\circ)$

(٢) أي القياسات الآتية قياسٌ لزاوية ربعيّة؟

(أ) 120° (ب) 190° (ج) 300° (د) 360°

(٣) أي القياسات الآتية قياسٌ لزاويةٍ مكافئةٍ للزاوية التي قياسها 135° ؟

(أ) -225° (ب) 225° (ج) -135° (د) 45°

(٤) ما قياس زاوية الإسناد للزاوية التي قياسها 200° ؟

(أ) 160° (ب) -60° (ج) 20° (د) -20°

(٥) زاوية قياسها $(\frac{\pi 3}{5})^\circ$ ، ما قيمة قياسها بالدرجات؟

(أ) 216° (ب) 54° (ج) 108° (د) $34,4^\circ$

(٦) زاوية قياسها 315° ، ما قياسها بالراديان؟

(أ) $\frac{\pi 7}{8}$ (ب) $\frac{\pi 7}{4}$ (ج) $\frac{\pi 315}{360}$ (د) $\frac{\pi 4}{7}$

(٧) ما سعة الاقتران: ق(س) = ٢ جتا ٣ س - ١؟

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ١- (د) ١

(٨) ما دورة الاقتران: ل(س) = ٣ جا ٢ س + ١ ؟

أ) π_2 ب) π ج) $\pi(\frac{2}{3})$ د) $\pi(\frac{3}{2})$

السؤال الثاني:

ما قيمة ما يأتي:

أ) جا 240° ب) جتا $-\frac{\pi 7}{4}$ ج) ظا 330° د) جا 40.5° ؟

السؤال الثالث:

أرسم منحنى كلٍّ من الاقتران الآتية:

أ) ق(س) = ٣ جا $(\frac{2}{3} س)$

ب) هـ(س) = ٢ - جتا (-س)

ج) ل(س) = ظاس - ١

د) ك(س) = جتا (س) - $(\frac{\pi}{2})$

نموذج اختبار ذاتي

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:
 (١) أي من الأزواج الآتية زوايا لها ضلع الانتهاء نفسه؟

(أ) $(70^\circ, -290^\circ)$ (ب) $(150^\circ, 210^\circ)$ (ج) $(100^\circ, 610^\circ)$ (د) $(\frac{\pi-}{\pi}, \frac{\pi}{\pi})$

(٢) المثلث الذهبي هو مثلث متساوي الساقين فيه نسبة طول أحد الساقين إلى طول القاعدة يساوي:

(أ) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{3}}$ (ب) $\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{3}}$ (ج) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{3}}$

(٣) زاوية قياسها $\frac{\pi}{3}$ قيمة قياسها بالدرجات يساوي:

(أ) 144° (ب) 135° (ج) 72° (د) 108°

(٤) ضلع انتهاء الزاوية (-60°) يقع في الربع:

(أ) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

(٥) زاوية الإسناد للزاوية 220° يساوي:

(أ) 80° (ب) 40° (ج) 60° (د) 140°

السؤال الثاني:

(١) إذا كانت هـ في الوضع القياسي، ومر ضلع الانتهاء لها بالنقطة $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}})$ أجب عن الأسئلة الآتية:
 (أ) في أي ربع تقع الزاوية هـ؟ وما قياسها؟
 (ب) اكتب النسب المثلثية الأساسية للزاوية هـ.

السؤال الثالث:

- جد القيمة الصغرى، والقيمة العظمى، والدورة، والسعة للإقتران $v = 5 \cos(3s - 4)$

إنشاءات هندسية (١) Geometric Constructions (1)

١٩

الإِنشاء الهندسيّ: هو رسم الأشكال والزوايا بدقّة، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار فقط.

أَتعلّم: يُمكن إثبات أيّ إنشاءٍ هندسيّ بأدلةٍ وبراهينٍ رياضيّة.

الأحظ أن: جميع الأشكال في النشاط السابق هي خطوطٌ مستقيمةٌ، أو دوائر، أو جزءٌ منهما.

لماذا تُستخدمُ الحافة المستقيمة والفرجارُ فقط في الإنشاءات الهندسيّة؟



١
نشاط



تنصيف قطعةٍ مستقيمة

• أفتحُ الفرجارَ فتحةً مناسبةً (أكبر من نصف طول \overline{AB})، لماذا؟

• أثبتُ الفرجارَ في النقطة P ، وأرسم دائرة (أو جزءاً من دائرة يقطع القطعة المستقيمة).

• بالفتحة نفسها أثبتُ الفرجارَ في النقطة B ، وأرسم دائرةً أخرى تتقاطع مع الدائرة الأولى.

• أحدّد نقاط تقاطع الدائرتين، وأسميهما J ، D ، وأصلُ بينهما.

• نقطة تقاطع المستقيم JD مع القطعة المستقيمة \overline{AB} هي نقطة المنتصف ولتكن M . لإثبات

أنّ النقطة M هي منتصف القطعة المستقيمة \overline{AB} هندسيّاً، أصل بين النقاط P ، J ، B ، D .

• الشكل الناتج هو:

العلاقة بين أقطاره: و


أستنتج: أنّ النقطة M هي:



٢

نشاط

أجدُ محيطَ المثلث ج ب هـ في متوازي الأضلاع المجاور، إذا علمت أن $ب د = د = ٤$ سم.




هـ $٣ = ٢$ سم $٣ = ٢$ سم $٣ = ٢$ سم
ب هـ = ؛ لأنَّ هـ هي نقطة منتصف القطعة
.....
محيط المثلث =



٣

نشاط


تنصيف زاوية:



- أَسْمِي الزاوية في الشكل المجاور:
- عناصرها:
-
-

أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبةً، وأثبتُ رأس الفرجار عند رأس الزاوية ب، وأرسم قوساً يقطع ضلعي الزاوية في النقطتين س، ص على التوالي.
أثبتُ الفرجار عند النقطة س، وأرسم قوساً بفتحة مناسبة.


أثبتُ الفرجار عند النقطة ص، وبالفتحة نفسها أرسم قوساً آخر، يقطع القوس الأول في النقطة ع.
فيكون ب ع منصف الزاوية.




للتحقّق هندسيّاً أنّ المستقيم ب ع هو منصف للزاوية س ب ص:

من تطابق المثلث ب س ع ، والمثلث ب ص ع فيهما:


مثال: رسم مستقيم موازٍ لآخر من نقطة معلومة.




• أرسم مستقيماً موازياً للمستقيم ل، ويمرُّ بالنقطة ب:




• أرسم من النقطة ب أيّ مستقيم، يقطع المستقيم ل في النقطة P.




• أفتحُ الفرجارَ فتحةً مناسبةً (أقلّ من P ب)، وأرسمُ قوساً من دائرة مركزها P ويقطع المستقيم P ب في النقطة ج، والمستقيم ل في النقطة د.



• أثبتُ الفرجار في النقطة ب، وبالفتحة نفسها أرسمُ قوساً آخر ويقطع المستقيم P ب في النقطة و.



• أفتحُ الفرجار فتحةً تساوي ج د، وأرسمُ قوساً من دائرة مركزها و يقطع القوس السابق في النقطة هـ.




• المستقيم ب هـ يوازي المستقيم ل.

ألاحظ: من التوازي ينتج أن $\angle د P ج = \angle هـ ب و$ وبالتناظر، ويُسمّى هذا الإنشاء نقلَ زاوية معلومة.

ملاحظة: يمكن الإفادة من إنشاء خطٍّ موازٍ لآخر في تمثيل حاصل ضرب عددين، وناتج قسمة عددين.

الإنشاء الهندسي لحاصل ضرب العددين: ٢ ، $ب$.

- أرسم المثلث فيه $س$ $ص$ $ع$ بحيث $س$ $ص$ = وحدة واحدة، $س$ $ع$ = $ب$ وحدة.
- على امتداد الضلع $س$ $ص$ أرسم قطعةً مستقيمة، طولها ٢ وحدة، ولتكن $ل$.
- من النقطة $ل$ أرسم مستقيماً موازياً للضلع $ص$ $ع$ ، ويقطع امتداد الضلع $س$ $ع$ في النقطة $هـ$.
- طول القطعة المستقيمة $س$ $هـ$ يمثل حاصل ضرب ٢ $ب$.



أوضِّح: أن طول $س$ $هـ$ = ٢ $ب$


المثلث $س$ $ص$ $ع$ يشابه المثلث

$$\frac{س \ ع}{س \ ص} = \frac{س \ هـ}{س \ ل}$$

$$س \ هـ = ٢ \ ب$$




تمارين ومسائل:



(١) أرسم القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفيّ ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث، وطولها يساوي نصف طوله. أرسم القطعة الواصلة بين منتصفيّ ضلعين في المثلث $س$ $ص$ $ع$ باستخدام الحافة المستقيمة، وأتحقق من النظرية بالقياس.

(٢) مُنصِّفات زوايا المثلث تتلاقى في نقطة واحدة، وهي مركز للدائرة المرسومة داخل المثلث. أرسم شكلاً هندسياً باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار يوضِّح ذلك.


مهمة تعليمية:



(٣) اشترى سالم طاولةً لحديقته المنزلية، يريد تثبيت مظلة في منتصفها ساعده في تحديد نقطة منتصف الطاولة لتثبيت المظلة.


إنشاءات هندسيّة (٢) Geometric Constructions (2)

٢٠



١
نشاط

إقامة عمود على قطعةٍ مستقيمةٍ من نقطة واقعة عليها.
أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة، وأرسم دائرةً مركزها P ،
تقطع القطعة المستقيمة في النقطتين: ج ، ب.
أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة، وأثبتهُ عند النقطة ج،
وأرسم قوساً.



بالتفتحة نفسها أثبتُ الفرجار عند النقطة ب، وأرسمُ قوساً
يقطع القوس الأول في النقطة هـ.
أكملُ الرسمَ لأحصلَ على العمود P هـ.
أتحقّقُ هندسيّاً من صحّة الرسم.



٢
نشاط

أرسمُ المثلث P ب ج القائم الزاوية في ب .
أمدُ القطعة المستقيمة من جهة ب، أكملُ خطواتِ إقامة
عمودٍ على قطعةٍ مستقيمةٍ من نقطة واقعةٍ عليها.



أتعلّم: تُستخدمُ الإنشاءات الهندسيّة لتمثيل الأعداد غير النسبيّة التي على هيئة جذورٍ تربيعيّة،
لأعدادٍ ليست مربعاتٍ كاملةً على خطّ الأعداد.

٣
نشاط


أمثّل $\sqrt{3}$ على خطّ الأعداد.


• بالرجوع إلى النشاط السابق، أنشئ عموداً على خطّ الأعداد عند $\sqrt{2}$ ، طولُه وحدة

واحدة، وأسّميه ج د .

• م د =

• أكملُ الرسم لتمثيل العدد $\sqrt{3}$.





في المثلث \triangle ب ج المجاور، $\frac{1-s}{2} = \text{ب}$ ، $\frac{1+s}{2} = \text{ج}$.
أجد طول الضلع ب ج .



باستخدام نظرية فيثاغورس:

$$(\text{ب ج})^2 = (\text{ب})^2 + (\text{ج})^2$$

$$(\text{ب ج})^2 = \left(\frac{1-s}{2}\right)^2 + \left(\frac{1+s}{2}\right)^2$$

وينتج أنّ: $(\text{ب ج})^2 = \dots = \dots$

أتعلم: لتمثيل جذر العدد s ، $s \leq 0$ على خطّ الأعداد، نقيم عموداً عند نقطة الصفر طولُهُ $\frac{1-s}{2}$ ، ونسمّيه \overline{PM} ، ثمّ نرسم قوساً من دائرة مركزها M ، ونصف قطرها $\frac{1+s}{2}$ ، ويقطع خطّ الأعداد. نقطة تقاطعه مع خطّ الأعداد هي تمثيل العدد \sqrt{s} .



أمثل $\sqrt{5}$ بالطريقة السابقة:

$$\frac{1-5}{2} = -2 = \text{طول العمود على محور السينات}$$

أرسم قوساً من دائرة مركزها M ،

ونصف قطرها


أعيّن $\sqrt{5}$ على خطّ الأعداد.



إنشاء عمودٍ على مستقيمٍ من نقطةٍ خارجةٍ عنه.

• أرسم المستقيم \overline{PM} ، والنقطة ج الخارجة عنه.





• أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة، وأثبتُه في النقطة ج، وأرسمُ قوساً
يقطعُ المستقيم في النقطتين س ، ص.

• أنصفُ القطعةَ المستقيمةَ $\overline{س ص}$ في النقطة م.

• أصلُ بين ج ونقطة المنتصف م.


لتوضيح أن $\overline{ج م}$ عموديٌّ على $\overline{س ص}$ هندسيًّا، أصلُ بين النقاط ج، س، ص، الشكل الناتج هو
مثلث
 $\overline{ج م}$ عموديٌّ على $\overline{س ص}$ ؛ لأنَّ

في الشكل المقابل أنشئ عموداً للمثلث $\triangle ب ج م$ من الرأس $م$ على القاعدة $\overline{ب ج}$.




النقطة $م$ نقطة خارجة عن المستقيم


أثبتُ الفرجار في النقطة $م$ ، وأرسم يقطع الضلع $\overline{ب ج}$ في النقطتين
أكملُ الرسم.



تمارين ومسائل:



(١) في المثلث متساوي الساقين، العمود المقام من منتصف القاعدة يمرُّ بالرأس، ويُصَفِّ زاويته. تحقِّق من صحّة النظرية؛ عن طريق الرسم بالحافة المستقيمة والفرجار.



(٢) أرسم ارتفاعاً لمتوازي الاضلاع من الرأس ص على القاعدة ع ل، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.

(٣) أنشئ الزوايا الآتية: ٤٥° ، $\frac{1}{2} \cdot ٢٢^\circ$.

(٤) أمثل الأعداد الآتية على خطّ الأعداد:

$$٣٧ - ، ١١٧ - ، ١ - ٧٧$$

مهمة تعليمية:



مصنّع للخزف يُنتج أطباقاً دائرية الشكل، أراد سامي تقديم هدية تذكارية لصديقه؛ بحيث تكون ساعة مثبتة على طبقٍ خزفيّ. كيف يمكن مساعدته في تحديد موقع تثبيت عقارب الساعة في الطبق باستخدام الإنشاءات الهندسية.

المثلث Triangle

٢١


رسم مثلث متساوي الساقين .

١

نشاط



أرسم مثلثاً متساوي الساقين، قاعدته $\overline{س ص}$ ؛
باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار:



• أفتحُ الفرجار فتحةً مناسبة.

• أثبتُ الفرجار عند النقطة $س$ ، وأرسم قوساً.

• بالفتحة نفسها أثبتُ الفرجار عند النقطة $ص$ ، وأرسم قوساً آخر
يقطع القوس الأول.

• نقطة تقاطع القوسين $ع$ هي الرأس الثالث للمثلث، أعينها على الرسم، وأكملُ الرسم باستخدام
الحافة المستقيمة.

• $\triangle س = \triangle ص$

أتذكر: العمود النازل من رأس المثلث متساوي الساقين على القاعدة يُسمى محور التماثل
للمثلث .

• أرسمُ محورَ التماثل للمثلث .

• أفتحُ الفرجار فتحةً مختلفةً عن السابق، وأحاولُ رسمَ مثلثٍ متساوي الساقين مختلفاً.

• كم مثلثاً متساوي الساقين يمكن رسمه على القاعدة $\overline{أ ب}$ ؟ أوضِّح العلاقة بين رؤوس هذه المثلثات.


..... باستخدام الفرجار أحددُ نوع المثلث المرسوم

• في المثلث متساوي الأضلاع قياس كلِّ زاويةٍ فيه يساوي

• عدد محاور تماثله

٢

نشاط






٣

نشاط

رسم مثلث متساوي الأضلاع

رسم مثلث متساوي الأضلاع قاعدته \overline{AB} باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار:



• أفتح الفرجار فتحةً مساويةً لطول القطعة \overline{AB} ، وأثبت الفرجار عند النقطة A ، وأرسم قوساً.

بالفتحة نفسها أثبت الفرجار عند النقطة B ، وأرسم قوساً آخر، يقطع القوس السابق.

- يكون الرأس الثالث للمثلث هو
- أكمل الرسم.



٤

نشاط

القطعة المتوسطة في المثلث

أرسم المثلث ABC .

أنصف الضلع BC بالنقطة D ،


وأصل بين A ، D ، فيكون $AD = \underline{\hspace{2cm}}$

مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \underline{\hspace{2cm}}$

مساحة المثلث $ABC = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

مساحة المثلث $ADC = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

ما العلاقة بين مساحة المثلثين؟



أتعلم: القطعة المتوسطة في المثلث هي القطعة المستقيمة الواصلة بين أحد رؤوس المثلث ومنتصف الضلع المقابل له.

- تتقاطع القطع المتوسطة للمثلث في نقطة واحدة.
- نقطة تقاطع القطع المتوسطة، تُقسَّم كلُّ قطعة منها بنسبة ٢ : ١ من جهة أي رأس.

في المثلث المجاور:




المثلث أ ب ج ، فيه: ل منتصف أ ب ، ن منتصف ب ج ، م منتصف أ ج ،

$$س ج = ٨ سم ، س م = ٣ سم .$$

$$ج س : ل س = ٢ : ١$$

$$ل س = ٤ سم .$$

$$ب س = \underline{\hspace{2cm}} سم .$$



تمارين ومسائل:


(١) أنشئ الزاوية 60° .

(٢) يعمل تامر في تصميم طائرات الأطفال، ساعده في إكمال الطائرة الورقية، التي أحد أقطارها القطعة المستقيمة المجاورة \overline{AB} . هل يمكنه إنشاء طائراتٍ مختلفة على القطر السابق نفسه؟ ساعده في ذلك.

(٣) AS ، CS قطع متوسطة في المثلث ABC ، وطول $CS = 6$ سم، أجد:


(أ) طول AN .

(ب) طول AS .



(٤) AB CD متوازي أضلاع، إذا كانت Z نقطة تقاطع القطرين، $B D = 24$ سم، M نقطة

تلاقي القطع المتوسطة للمثلث ABC ، أ تلاقى القطع المتوسطة للمثلث ABC ، أجد MZ .



مهمة تعليمية:

المثلث الذهبي: هو مثلث متساوي الساقين، فيه نسبة طول أحد الساقين إلى طول القاعدة يساوي


النسبة الذهبية، وتساوي $\phi = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار أرسّم رسماً تقريبياً

لمثلث ذهبي.

تكافؤ الأشكال الهندسية Equivalence of Geometric Figures

٢٢


أحسب مساحة الأشكال الهندسية الآتية:




مستطيل



مربع



مثلث



متوازي أضلاع




- مساحة المربع = سم^٢ ، مساحة المستطيل = سم^٢
- مساحة المثلث = سم^٢ ، مساحة متوازي الأضلاع =
- مساحة متوازي الأضلاع = مساحة
- نقول: إن متوازي الأضلاع يكافئ المربع
- مساحة المثلث = مساحة
- نقول: إن المثلث يكافئ

تعريف:

الشكلان الهندسيان المتكافئان هما شكلان متساويان في المساحة.

يمثل الشكل المجاور متوازي الأضلاع P ب ج د ، وُصِّلَ القطر P ج ، فنتج المثلثان



P ب ج ، P ج د فيهما:

P ب = ، P ج د =

قياس زاوية P ب ج = قياس زاوية

إذن: ينطبق المثلثان ب


إذا كان ب ج د = ١ سم ، P هـ = ٦ سم

مساحة المثلث P ب ج = ، مساحة المثلث P ج د =

المثلثان P ب ج ، P ج د متكافئان.



أستنتج: إذا تطابق شكلان هندسيان فإنهما متكافئان.



في الشكل المجاور $م$ ب ج د ، هـ
ب ج و متوازي أضلاع مشتركان في
القاعدة $ب ج$ ، ومحصوران بين
مستقيمين متوازيين، $ب ج = ٤$ سم،
هـ ج = ٦ سم




مساحة متوازي الأضلاع هـ ب ج و = القاعدة \times الارتفاع

ارتفاع متوازي الأضلاع $م$ ب ج د =

مساحة متوازي الأضلاع $م$ ب ج د = \times
إذن: متوازي الأضلاع $م$ ب ج د يكافئ متوازي الأضلاع هـ ب ج و. لماذا؟

نظرية:

متوازي الأضلاع المشتركان في القاعدة، والمحصوران بين مستقيمين متوازيين يكونان متكافئين.



قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع،
طوله ٠.٣ م، وارتفاعه ٠.٢ م، اتفق صاحبها
على تعديل الحدود مع جيرانه؛ بحيث
تصبح القطعة مستطيلةً وبالمساحة نفسها؛
وذلك باقتطاع مثلث قائم الزاوية من جهة،
وإضافة مثلث قائم الزاوية بالمساحة نفسها
من الجهة الأخرى. أجد:



مساحة قطعة الأرض قبل التعديل = \times =

مساحة قطعة الأرض بعد التعديل = الطول \times العرض.

طول متوازي الأضلاع = طول المستطيل، لماذا؟

ارتفاع متوازي الأضلاع = عرض المستطيل، لماذا؟


$م$ د // ب ج لماذا؟ ماذا ألاحظ؟

نظرية: متوازي الأضلاع يكافئ المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.

أنتنتج: مساحة المثلث = المشترك معه في القاعدة، والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.

نظرية:

مساحة المثلث تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين.



في الشكل المجاور P ب ج د مستطيل، فإذا كانت مساحة المثلث P ب و = ١٠٠ سم^٢، ومساحة المثلث و ج د = ٥١ سم^٢، أجد مساحة المثلث و ب ج:



أقيم العمود $\overline{وه}$ ، المثلث P ب و يكافئ المثلث

.....، لماذا؟

مساحة المثلث و ب ه =

مساحة المثلث و ه ج = لماذا؟


.....

لكن المثلث و ب ج يتكوّن من المثلثين: و

إذن: مساحته = + =

مساحة المستطيل P ب ج د تساوي


هل يمكن إيجاد مساحة المستطيل في النشاط السابق بطريقةٍ أخرى؟



أنتنتج:


المثلثان المحصوران بين مستقيمين متوازيين ولهما القاعدة نفسها متكافئان.

تمارين ومسائل:



(١) $\triangle ج د ب$ مستطيل، فيه النقطة هـ منتصف $\overline{م ب}$ ، والنقطة س منتصف $\overline{د م}$ ، أُسمي ٣ أزواج من المثلثات المتكافئة.

(٢) $\triangle ج د ب$ مثلث، مساحته $٠.٢ سم^٢$ ، $\overline{د م}$ قطعة متوسطة في المثلث، إذا أنزلَ عمودًا من النقطة د على الضلع $\overline{ج د}$ طوله ٤ سم، أجد طول $\overline{ج د}$.




(٣) في الشكل المجاور $\overline{م ب} \parallel \overline{و د}$ ، $\overline{ج د} \parallel \overline{و هـ}$

، $\overline{م ب} \parallel \overline{و هـ}$. أيبين أن:

أ) مساحة $\triangle ب د و$ تساوي مساحة $\triangle ج د و$.
ب) المثلث $\triangle ب ج د$ يكافئ المثلث $\triangle و د هـ$.

(٤) $ل$ ، $م$ مستقيمان متوازيان، $ب ج = د و = ل س$
أيبين: أن المثلث $\triangle ب ج د$ ، والمثلث $\triangle د هـ و$ ، والمثلث $\triangle ع ل س$ مثلثات متكافئة.




(٥) $\triangle ب ج د$ شبه منحرف، فيه $\overline{م د}$ يوازي $\overline{ب ج}$ ، وُصِلَ قطراه $\overline{م ج}$ ، $\overline{ب د}$ فتقاطعا في النقطة م. أيبين أن المثلث $\triangle ب م د$ يكافئ المثلث $\triangle د م ج$.

(٦) P ب ج مثلث مساحته ٨ سم^٢، أنشئ على قاعدته $\overline{ب ج}$ المربع $س ب ج د$ ، بحيث تقع

النقطة P على $س د$. أجد:

أ) مساحة المربع $س ب ج د$.
ب) طول $\overline{ب ج}$.

مهمة تقويمية:




(١) يُمثّل الشكل المجاور شارعين متوازيين، هـ و ع، ل و ع قطعتي أرضٍ مثلثتي الشكل، متداخلتين ومشاركتين في القاعدة. أبتن أن المثلثين هـ و ع، ل و ع متكافئان.

مساحة القطعة هـ و ع = $\frac{1}{2}$ القاعدة \times الارتفاع = \times

مساحة القطعة ل و ع = \times


لكن الارتفاع هـ س = الارتفاع ل ص لماذا؟.....

إذن: مساحة المثلث هـ و ع = مساحة المثلث ل د ع



(٢) ارسم أشكالاً رباعية مختلفة مكافئة للمربع P ب ج د، ومحصورة

بين المستقيمين $\overline{أ ب}$ ، $\overline{ج د}$ في الشكل:



(٣) أ) أرسم مخطّطاً تفصيلياً لملاعب كرة القدم، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.

ب) اقترح أبعاداً مناسبة للملاعب للاستفادة من قطعة أرض أبعادها ١٥٠ م، ١٠٠ م لتصميم ذلك الملعب.

الأسهم (Shares)

٢٣

أتعلّم: السّهم: عبارة عن صكّ يثبت أنّ لحامله حصّةً في ملكيّة أصول شركةٍ مساهمةٍ معيّنة، إضافةً إلى حقّه في نسبةٍ من أرباحها.

القيمة الاسمية للسّهم: هي قيمة السهم عند الشراء، وهي القيمة التي تظهر في الدفاتر المحاسبية، وعلى شهادة السّهم.

ملاحظة: يُعتمد في حساب الأرباح في الأسهم الربح البسيط.

$$\begin{aligned} \text{أودع محمودٌ مبلغ ٢٥٠٠ ديناراً في بنكٍ بسعر فائدة سنوية ١,٥\%.} \\ \text{مقدار ربحه في نهاية السنة} = ٢٥٠٠ \times \dots = \dots \\ \text{إذا أودع المبلغ لمدة ٥ سنوات فإنّ ربحه} = \dots \times \text{نسبة الفائدة} \times \text{المدة} \\ \dots = \dots \times \dots \times \dots = \dots \end{aligned}$$



يمتلك غسان ٢٠٠ سهم في شركة الحافلات الوطنية، قيمة السّهم الاسميّة ٤ دنانير. إذا وزعت الشركة الأرباح السنويّة بنسبة ١٠\%، فإنّ: ربح غسان في السنة = عدد الاسهم × القيمة الاسمية للسهم × نسبة الارباح

$$\dots = \dots \times \dots \times \dots = \dots$$



القيمة الحاليّة للسّهم: هي قيمة السهم في السوق المالي لحظة التداول.

يملك جابر ٥٠٠ سهم في مصنعٍ للخام، قيمة السهم الاسميّة دينار، وقيمتها الحاليّة دينار ونصف.

$$\text{القيمة الحاليّة لجميع الأسهم} = \text{القيمة الحاليّة للسهم} \times \text{عدد الأسهم} \\ \dots = ٥٠٠ \times \dots = \dots$$



إذا وزّع المصنع أرباحاً قيمتها ٨\%،

$$\text{فإنّ مقدار ربح جابر} = \dots \times \dots \times \dots = \dots$$

$$\text{النسبة المئوية الحاليّة للربح في الأسهم} = \frac{\text{مقدار الربح}}{\text{القيمة المالية للأسهم}} \times ١٠٠\%$$

$$\dots = \dots \text{ النسبة المئوية الحاليّة لربح جابر}$$

تمارين ومسائل:

١) تمتلك بيسان ٥٠٠ سهم في أحد البنوك الفلسطينية، القيمة الاسمية للسهم دينار واحد، بينما القيمة الحالية للسهم في السوق ٢,٧٥ ديناراً، فإذا وزّع البنك ٢٠٪ أرباحاً في إحدى السنوات، أحسب:

أ) مقدار ربح بيسان.

ب) القيمة الحالية لأسهم بيسان.

ج) النسبة المئوية الفعلية للربح.

٢) قامت إحدى شركات الأدوية الفلسطينية بطرح أسهم للاكتتاب العام، بسعر القيمة الاسمية دينار واحد، بالإضافة لعلاوة إصدار بقيمة ٤ دنانير للسهم الواحد، اكتتب أحمد ٨٠٠ سهم، أحسب:

١) قيمة السهم التي اكتتب بها أحمد.

٢) إذا قامت الشركة بتوزيع ٢٠٪ أرباحاً في نهاية إحدى السنوات، أحسب:

أ) مقدار الربح الذي حصل عليه أحمد.

ب) النسبة المئوية الفعلية لهذا الربح، علماً بأن قيمة السهم الحالية ٥ دنانير.

مهمة تقويمية:

قررت إدارة مدرسة الجليل الثانوية أن تحول مقصف المدرسة إلى جمعية مساهمة عامة، فطرح أسهم المقصف للشراء من قبل الطالبات بقيمة اسمية تعادل ١ دينار للسهم، فإذا اشترت جيهان ٢٠٠ سهم، ووزعت المدرسة في نهاية العام أرباحاً بنسبة ٢٠٠٪، أحسب ربح جيهان في نهاية العام الدراسي.

ورقة عمل:

السؤال الأول:


أمثلُ على خطِّ الأعداد:

$$\sqrt{2}، \sqrt{3} - 1، 1 - \sqrt{5}، 1 + \sqrt{2}$$

السؤال الثاني:

أرسم زوايا قياسها 30° ، 15° .

السؤال الثالث:



١ ب ج د ، ٢ و هـ د متوازيًا أضلاعٍ مشتركان في القاعدة
٢ د ، ومحصوران بين مستقيمين متوازيين كما في الشكل
المجاور. بيّن أنّ الشكل ١ ب ج ز يكافئ د ز و هـ.

السؤال الرابع:

اشترى أحمدُ ٢٠٠٠ سهمٍ من شركة صامد للموارد الإنشائية، بقيمة اسمية مقدارها ٤ دنانير للسهم، فإذا كانت الأرباح المستحقة له في نهاية سنتين بحساب الربح البسيط ٨٨٠ دينارًا. أجدُ معدل الفائدة السنوي الذي حددته الشركة.

السؤال الخامس:

اشترى سمير ٢٠٠٠ سندٍ من البنك العقاري، بقيمة اسمية مقدارها ٣ دنانير، وبفائدة معيّنة لمدة أربع سنوات، فإذا حصل على عائد مالي كلي مقداره ٧٩٢٠ دينارًا، أحسب معدل الفائدة التي حددها البنك.

اختبار ذاتي

السؤال الاول: أضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما يأتي:

(١) أ ب ج د مربع مساحته ٣٦ سم^٢ ، ه منتصف ب ج ، مساحة المثلث أ ه ج يساوي:

أ) ١٦ سم^٢ (ب) ٩ سم^٢ (ج) ١٨ سم^٢ (د) ٢٠ سم^٢

(٢) مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل السداسي هو:

أ) ٧٢٠° (ب) ١٢٠° (ج) ٣٦٠° (د) ١٠٥٠°

(٣) يمتلك محمود ٥٠٠ سهم في شركة جوال للاتصالات قيمة السهم الاسمية ٢ دينار

إذا وزعت الشركة الأرباح السنوية بنسبة ١٠٪ فإن ربح محمود في السنة يساوي:

أ) ١٠٠ دينار (ب) ٢٠٠ دينار (ج) ٥٠٠ دينار (د) ١٠٠٠ دينار

(٤) أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب ، فيه: أ ب = ٨ سم ، ب ج = ٦ سم ، د منتصف أ ج ،

فإن طول $\overline{ب د}$ يساوي:


أ) ٤ سم (ب) ٣ سم (ج) ١٠ سم (د) ٥ سم

(٥) اشترت هدى ٢٠٠٠ سند من مصنع للألبان بقيمة اسمية مقدارها مقدارها ٣ دنانير، وبعد ٣ سنوات حصلت على أرباح بقيمة

٣٦٠٠ دينار، ما معدل الفائدة التي حددها المصنع لهدى؟

أ) ٢٠٪ (ب) ٥٠٪ (ج) ١٠٪ (د) ٣٠٪

(٦) في الشكل المجاور أ ب ج د مستطيل مساحته م وحدة مربعة ، ما مساحة المثلث ه ج ب ؟



أ) $\frac{M}{4}$ (ب) $\frac{M}{3}$ (ج) م (د) ٢ م

السؤال الثاني:

1) أ ب قطعة مستقيمة أنشئ العمود ج د في منتصف أ ب ، ثم أنشئت الزوايا الآتية باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار؟

$$\text{أ) الزاوية أ د هـ} = 135^\circ$$

$$\text{ب) الزاوية أ د و} = 157,5^\circ$$

2) ارسم منحنى الاقتران ق (س) = 2 جا 3س + 1

2) أمّن عليّ على سيارة ثمنها 20 ألف دينار تأميناً شاملاً يدفع 400 دينار قسطاً سنوياً على أن تدفع شركة التأمين 60% من ثمن السيارة إذا تعرضت للتلف ، إذا تعرضت السيارة بعد 10 سنوات لحادث سير، أصبحت السيارة بعده غير صالحة للاستعمال احسب:

1) المبلغ الذي ستدفعه السيارة لعلّي .

2) مقدار ربح أو خسارة شركة التأمين .